

SINGULAIR® 10 mg Filmtabletten/-junior® 5 mg Kautabletten/- mini 4 mg Kautabletten
Wirkstoff: Montelukast-Natrium. **Zusammensetzung:** Arzneilich wirksame Bestandteile: 1 SINGULAIR® mini 4 mg Kautablette enthält 4,2 mg Montelukast-Natrium, entsprechend 4,0 mg Montelukast; 1 SINGULAIR junior® 5 mg Kautablette enthält Montelukast-Natrium 5,2 mg, entsprechend 5,0 mg Montelukast; 1 SINGULAIR® 10 mg Filmtablette enthält Montelukast-Natrium 10,4 mg, entsprechend 10 mg Montelukast.
Sonstige Bestandteile: SINGULAIR® mini 4 mg Kautabletten: D-Mannitol; Mikrokristalline Cellulose; Hyprollose; Eisen(III)-oxid (Farbstoff E 172); Croscarmellose-Natrium; Kirsch-Aroma, Permaseal®, künstlich, 181612 Givaudan-Roure, Aspartam und Magnesium (stearat, palmitat, oleat). SINGULAIR junior® 5 mg Kautabletten: D-Mannitol, Mikrokristalline Cellulose, Hyprollose, Eisen(III)-oxid (Farbstoff E 172), Croscarmellose-Natrium, Permaseal®, synthetisches Kirsch-Aroma 181612, Aspartam, Magnesiumstearat. SINGULAIR® 10 mg Filmtabletten: Mikrokristalline Cellulose, Lactose Monohydrat (89,3 mg), Croscarmellose-Natrium, Hyprollose, Magnesium (stearat, palmitat, oleat), Filmüberzug: Hypromellose, Hyprollose, Titan-dioxid (Farbstoff E 171), Eisen (III)-oxid (Farbstoff E 172), Eisen-oxidhydrat (Farbstoff E 172), Carnaubawachs. **Anwendungsgebiete:** Als Zusatzbehandlung bei Patienten mit leichtem bis mittelgradigem chronischem Asthma, das mit einem inhalativen Kortikoid nicht ausreichend behandelt und das durch die bedarfsweise Anwendung von kurzwirksamen β -Sympathomimetika nicht ausreichend unter Kontrolle gebracht werden kann. Zur Prophylaxe der belastungsinduzierten Broncho-konstriktion (Belastungsasthma). **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile dieser Arzneimittel. **Warnhinweis:** Die 4-mg-Kautabletten und die 5-mg-Kautabletten enthalten Aspartam. **Nebenwirkungen:** SINGULAIR® mini 4 mg Kautabletten: Durst wurde häufig als Nebenwirkung bei mit Montelukast behandelten Patienten angegeben. Auch wenn ein ursächlicher Zusammenhang mit Montelukast nicht gesichert werden konnte, wurde folgende unerwünschte Arzneimittelwirkung angegeben, die bei mehr als 3 % der pädiatrischen Patienten von 2 – 5 Jahren und häufiger als unter Placebo auftrat: Husten. SINGULAIR junior® 5 mg Kautabletten: Die häufigste Nebenwirkung, die in Verbindung mit der Einnahme von SINGULAIR junior® 5 mg Kautabletten stehen könnte, war Kopfschmerz. Auch wenn ein ursächlicher Zusammenhang mit Montelukast nicht gesichert werden konnte, wurden folgende unerwünschte Arzneimittelwirkungen angegeben, die bei mehr als 3 % der pädiatrischen Patienten von 6 – 14 Jahren und häufiger als unter Placebo auftraten: Pharyngitis, Influenza, Fieber, Sinusitis, Übelkeit, Diarrhoe. SINGULAIR® 10 mg Filmtabletten: Die häufigsten Nebenwirkungen, die in Verbindung mit der Einnahme von SINGULAIR® 10 mg Filmtabletten stehen könnten, waren abdominelle Beschwerden und Kopfschmerzen. Auch wenn ein ursächlicher Zusammenhang mit Montelukast nicht gesichert werden konnte, wurden folgende unerwünschte Arzneimittelwirkungen angegeben, die bei mehr als 1 % der Patienten und gleich häufig oder häufiger als unter Placebo auftraten: Kopfschmerzen, abdominelle Beschwerden, Schwäche/Erschöpfung, Fieber, Trauma, Diarrhoe, Dyspepsie, infektiöse Gastroenteritis, Zahnschmerzen, Schwindel, Insomnie, verstopfte Nase, Husten, Influenza, Exantheme. Unter der Therapie mit Montelukast wurde nach Markteinführung folgendes berichtet: Schwäche/Erschöpfung, Unwohlsein, Ödeme, Überempfindlichkeitsreaktionen (einschließlich Anaphylaxie, Angioödem, Urtikaria, Juckreiz, Exanthem und – ein Einzelfall mit eosinophilen Leberinfiltraten); Schwindel, verändertes Träumen einschließlich Alpträume, Benommenheit, Schlaflosigkeit, Reizbarkeit, Ruhelosigkeit, Krampfanfälle; Arthralgie, Myalgie einschließlich Muskelkrämpfe; Diarrhoe, Mund-trockenheit, Dyspepsie, Übelkeit, Erbrechen; erhöhte Blutungsneigung, Bluterguss. **Hinweis für Verkehrsteilnehmer:** Es ist nicht zu erwarten, dass SINGULAIR® die Fahrtüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen eines Patienten beeinträchtigt. Allerdings wurde sehr selten von einzelnen Patienten über Benommenheit berichtet. **Dosierung:** Kinder von 2 – 5 Jahren: 1 Kautablette SINGULAIR® mini 4 mg tgl. vor dem Schlafengehen. Kinder von 6 – 14 Jahren: 1 Kautablette SINGULAIR junior® 5 mg tgl. vor dem Schlafengehen. Erwachsene: 1 Filmtablette SINGULAIR® 10 mg tgl. vor dem Schlafengehen. Die Anwendung von Montelukast bei Kindern unter 2 Jahren wird nicht empfohlen, bis weitere Daten vorliegen, da die Erfahrungen begrenzt sind. **Verschreibungspflichtig.**

Stand: 01/2002

Weitere Informationen enthalten die Fach- und die Gebrauchsinformationen, deren aufmerksame Durchsicht wir empfehlen.

DIECKMANN ARZNEIMITTEL GMBH
 Postfach 1202, 85530 Haar

Mitvertrieb:
 MSD SHARP & DOHME GMBH, 85530 Haar
 MSD CHIBROPHARM GMBH, 85530 Haar
 CHIBRET PHARMAZEUTISCHE GMBH, 85530 Haar
 VARIPHARM ARZNEIMITTEL GMBH, 85530 Haar

meine YAHOO! Für Ärzte

www.meinearztseite.de/Hotline: 0800/6730673

MSD
Infocenter

Tel.: 0800/673 673 673
 Fax: 0800/673 673 329
 e-mail: infocenter@msd.de




Abb.: Akute Pankreatitis

Strategien und Trends in der bildgebenden Diagnostik bei Kindern – IV: Abdomen
Marbod Reither 722

Marfan-Syndrom und Homocystinurie – eine Kasuistik
Gudrun Wiedemann 726

Consilium Infectiorum: Sonnenschutz bei Kleinkindern
Thomas Jansen 730

Magazin

„Kinder welche man inoculieren will“ – so impfte man vor 250 Jahren
Rainer Frenzel 732



Bücher 735

Leserbrief von Gerda Piekenhagen zur „Medienerziehung“ .737

Fortbildungstermine des BVKJ 738

Tagungen 740

Programm 30. Herbst-Seminar-Kongress Bad Orb 741

Berufsfragen

Der Honorarausschuss informiert
Wolfram Hartmann 749

Personalia 752

BVKJ-Workshop macht „Fit for DRG’s“ 754

Wahlaufrufe der Landesverbände Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Sachsen 755

4. Klinikärzteseminar des BVKJ: Kinder- und Jugendärzte in der Klinik – heute und morgen „up to date“ 756

Wichtige Telefon- und Telefax-Nummern/ Impressum 760

Pharma-Info 758

Praxistafel 757

Beilagenhinweis

Dieser Ausgabe liegt eine Information der Firma Boots Healthcare, Reinbek, bei.
 Wir bitten um freundliche Beachtung!

Zum Titelbild:

Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt hält Impfungen für eine der wichtigsten Präventivmaßnahmen. Überraschend besuchte sie den Kinder- und Jugendarzt Dr. Gerald Ulbricht in seiner Berliner Praxis und leistete der kleinen Melina „ministeriellen Beistand“ beim Pieks.

Foto: fotoagentur axentis, Berlin

Die vielfältigen Angebote des 1. Deutschen Impftages entnehmen Sie bitte den Seiten 681 ff.