

Viererkombi für das Herz

Optimaler Schutz
nach Infarkt. 10

Impressum 10

Flimmern, Hochdruck, Hypertrophie

Vermeiden Sie den
Schlaganfall! 11

Plättchen gleich doppelt hemmen!

Die aktuellen ESC-Leitlinien bei
stabiler Angina. 12

Keine Angst vor Betablockern

Selbst schwer Herzinsuffiziente
profitieren von gekonnter
Blockade. 12

Aneurysma ans Messer?

Auf die Größe kommt es an,
ob beim Aortenaneurysma
Zuwarten erlaubt ist! 13

Nichts geht ohne Diuretikum

Zumindest bei der Herz-
insuffizienz – aber bitte auf die
Bioverfügbarkeit achten! 15

**Mit dem Passwort doc
finden Sie in
www.medical-tribune.de
spezielle Informationen
für Ärzte.**




Gottwik legt
Katheterzahlen
vor

ren, aber unerlässlichen Maßnah-
men gehört eindeutig die Präventi-
on. Hier werden laut Dr. Yach in den
Kliniken jedes Jahr millionenfach
beste Gelegenheiten verpasst.

Der ESC-Präsident Professor Dr.
MAARTEN L. SIMOONS bezeichnete
es als begrüßenswerten Schritt, dass

werde entsprechend zurückgehen.
Gegen eine Umbenennung der Ge-
sellschaft in „European Society of
Cardiology and Vascular Medicine“
hätte er nichts einzuwenden, zeige
die Gefäßmedizin doch vielfache



**24. Kongress der European
Society of Cardiology**

Professor
der Präsi-
gesellschaft,
sprache a
Fachwelt,
zu häufig
Zahlen für
oplastien
PTCA) la
in der Tab
Profess
Universit
die hohe
Referat z
liche Stu
ESC vorg

Stumme Ischämie am Herz

So gefährlich wie KHK

**BERLIN – Eine stumme
Myokardischämie, die sich
nur im EKG zeigt, sollte bei
KHK-Patienten genauso ernst
genommen werden wie der
schmerzhafte Angina-pectoris-
Anfall: Sie hat vergleichbare
prognostische Bedeutung.**

Die typische Angina pectoris ist
bei KHK-Patienten nur die Spitze
des Eisbergs, sagte Professor Dr.
MANFRED ZEHENDER von der Uni-
versitätsklinik Freiburg auf dem Eu-
ropäischen Herzkongress. Asymp-
tomatische ST-Senkungen findet

man oft schon vor den schmerzhaft-
ten Attacken und bei zwei Dritteln
der Patienten auch parallel dazu.
Besonders häufig sind Diabetiker
von stummen Myokardischämien
betroffen.

Gefäße auch ohne Symptome verengt

Die Vorstellung, dass die Arterien
bei fehlenden Symptomen noch
nicht so stark verengt sind, ist falsch,
meinte der Kardiologe. Bei einer
75%igen Koronarstenose lassen
47 % der Patienten Angina-pecto-
ris-Anfälle „vermissen“, 10 % wei-
sen keine ST-Senkungen im Belas-

tungs-EK
tungs-EK
man bei
auch ST-
Mehr
dien zu
der Pro
Untersch
tischen u
kardisch
die führ
blockern
chämien
lativen
kardialer
Jahr. Die
weise, d

MEIN HERZ SOLL ZU LANG-
-CAM SPIN... DABEI ESSE ICH NUR