

Perspektiven

Grünes Licht für DMPs

Nach der Wahl signalisieren die KVen Zusammenarbeit. 17

Mit Impfmobil contra KV

Der Streit ums Honorar verschärft sich. 18

Ringüberweisern auf der Spur

Erweiterte Plausi-Prüfung bringt Kollegen in Bedrängnis. 19

Praxisführung und Geld

Nach Stippvisite Zeugnis ausstellen?

Ob die HelferIn nach sechs Wochen Tätigkeit Anspruch auf ein qualifiziertes Zeugnis hat, klärt unser Online-Experte. 26

Ohne Innere Praxis gerettet

Wie eine Kollegin die drohende Pleite umschiff. 29

Mit dem Passwort doc finden Sie in www.medical-tribune.de spezielle Informationen für Ärzte.



Gewinnen mit Concor® COR

- 1x Gabe bei echter 24h-Wirkung
- sehr hohe β_1 -Selektivität
- günstige Tages-therapiekosten

Concor® COR 1,25/2,5/3,75/5/7,5/10 mg. Wirkstoff: Bisoprololhemifumarat. Verschreibungspflichtig. Zus.: 1 Filmtabl. Concor COR 1,25/2,5/3,75/5/7,5/10 mg 9 marat. Sonst. Bestandteile: Hochdisp. Siliciumdioxid, Magnesiumstearat, Crospovidon, mikrokristalline Cellulose, Maisstärke, Calciumhydrogenphosphat, Dimetic Concor COR 1,25 mg: vorverkl. Stärke. Concor COR 3,75/5/7,5/10 mg: E172. Anwend.: Stab. chron. mittelgradige bis schwere Herzinsuff. bei eingeschränkter syst. V mern u. Diuretika (optional Herzglyk.). Gegenanz.: Akute od. dekomp. Herzinsuff. (wenn inotrope Substanzen i.v. erforderl.). Kardiogener Schock. AV-Block II/III. Bradykardie (<60/min v. Behandl.). Hypotonie (syst.<100 mmHg). Schweres Asthma bronch. od. schwere COPD. Spätstadien d. PAVK. od. M. Raynaud. Metab. Az Phäochromocytom erst nach Alpha-Blockade. Warnhinw. u. Vorsichtsmaßnahmen f. Anwend.: Vorsicht bei: Bronchospasmen (Asthma bronch., obstrukt. Atemweg Diab. mell. m. stark schwank. BZ-Werten (Hypoglyk.symp. evtl. verschleiert), strengem Fasten, lauf. Desensib.ther., AV-Block I, Prinzmetal-Angina, PAVK (Verstärk. ausreich. Therapieerfahr. b. herzinsuff. Pat. m. Herzinsuff. NYHA II, insulinabh. Diab. mell. (Typ I), Nierenfkt.störg. (S.-Kreat. \geq 3,4 mg/dl), Leberfkt.störg., Pat. > 80 krankg., hämodyn. rel. Vitiën, Myokardinf. < 3 Mon.. Bei Psoriasis in Eigen-/Familienanamn. sorgf. Nutzen-Risiko-Abwägung. Sympt. einer Thyreotoxikose evtl. Überwachg. d. Pat. erforderl.. Bisoprolol oh. zwingende Indikation nicht abrupt beenden. Concor® COR während Schwangerschaft u. Stillzeit mangels ausreichend. Erschöpfung, Schwindel, Kopfschmerz; Schlafstörg., Depress.; Alträume, Halluzinationen. Vermind. Tränenfluss (Kontaktlinsen!); Konjunktivitis. Hörstörg.. Kälte-Block, Verschlechterg. d. Herzinsuff., orthostat. Hypotonie. Bronchospasmus b. Pat. m. Asthma bronch. od. obstrukt. Atemwegserkrankg. in Anamnese; allerg. Rhin. Übelk., Erbrechen, Diarrhoe, Obstip., Muskelschw./-krämpfe. Allerg. Reaktionen (Ueckaen, Flush, Exanthem); Einzelf.: Haarausfall. Potenzstörg.. Erhöhung v. Leberenz. (GOT, GPT), Triglyz.. Hepatitis. Nähere Info. s. Fach- und Gebrauchsinformation. Stand: 02/02, Merck KGaA, 64271 Darmstadt. www.merck.de