


ÄRZTE ZEITUNG



ZB MED DIE TAGESZEITUNG FÜR ÄRZTE

STAG 22. JANUAR 2002


D 8877 NR. 12 JAHRGANG 21



Sucht hinter Gittern wird oft ignoriert

Kein Mitgliedsland der Europäischen Union hat den Drogenkonsum hinter Gittern im Griff. Das ist das Fazit eines Berichtes, der von der Uni Bremen erstellt wurde.


GESUNDHEITSPOLITIK 8



Teilhandprothese – kurz und leicht

Nach Teilamputationen der Hand ermöglicht die elektrisch arbeitende Transcarpal-Prothese den betroffenen Patienten weiterhin ein sicheres Greifen.

MEDIZIN 10



In Gummistiefeln am Op-Tisch

In der staatlichen Klinik in La Ceiba in Honduras war das Dach undicht. Der Brandenburger Gynäkologe Dr. Siegfried Seibt hat deshalb eine eigene Klinik aufgebaut.

KULTUR/GESELLSCHAFT 17

GESPRÄCH

...en mit gebrochenen Knochen
...e keine Schmerzen haben,
...t es Patienten mit einem Charcot-
...st spät zu ihren Ärzten.

2

ERGRUND

...onalausweis auf Chipkarte
...ontakt zu Behörden könnte in Zu-
...erheblich vereinfacht werden:
...den Einsatz von Chipkarten.

3

NDHEITSPOLITIK

...ankheitskur
...annbund will GKV entlasten:
...e und unkomplizierte Krankheit
...keine Pflichtleistung sein.

6

ZIN

Vieltrinker senken Alkoholmenge nach Gesprächen mit Hausärzten

Kurzzeit-Interventionen bringen tatsächlich Erfolge / Studie mit 774 Patienten


MADISON (gwa). Kurzzeit-Interventionen durch Hausärzte sind tatsächlich geeignet, Patienten mit erhöhtem Alkoholkonsum zu bewegen, weniger zu trinken. Fragen zum Trinkverhalten, Hinweise etwa auf erhöhte Leberwerte und Absprachen über Trinkmengen haben bei etwa 20 Prozent von ihnen Erfolg.

Zur dieser Intervention gehört auch, regelmäßig kurz mit den Pa-



wurden die Patienten nach sechs Monaten und dann jährlich befragt, wieviel sie in der jeweils vergangenen Woche getrunken und wie oft sie die Kontrolle über die Trinkmenge verloren hatten (Alcoholism: Clinical and Experimental Research 26, 2001, 36).

Im Vergleich zur Kontrollgruppe gelang es den Patienten in der Interventionsgruppe, die Alkoholmenge um durchschnittlich ein Drittel zu senken. Dieser Effekt



Lichtmikroskopische Aufnahme fluoreszenzmarkierter Endothel-

DR. ZENKABIELLOTHKE
JOSEPH-STELZMAN-STR. 9

ZEITSCHRIFTENSTELLE
50931 KEELN

2.655 38