


Inhalt

- 48.....** *Erkrankungen der Vulva (III): Bei schwerer Vulvitis ohne Leukozytose in der Nativmikroskopie muss auch an ein fixes Arzneimittalexanthem gedacht werden.*
- 52.....** *Kolposkopie – auf einen Blick: Folge XXXI.*
- 53.....** *Brustkrebs-Früherkennung: Stellungnahme der DGGG (Prof. Dr. H.G. Bender).*
- 55.....** *Editorial: Sie lächelt immer noch mehr Chaos ins Gesundheitswesen – die Bundesgesundheitsministerin.*
- 57.....** *Aus den Universitäten.*
- 60.....** *Östrogenmangel-Syndrom: Zu wenig Schlaf macht krank.*
- 61.....** *Pille versus Placebo: Mikropille Leios® macht keinen „dicken Kopf“ (gyne extra).*
- 64.....** *Vom Fettbauch bis zur Obstipation: Neues aus dem „Wundergarten“ der Hormone.*
- 66.....** *Repräsentative Umfrage: „Frauenleiden“ sind eine Volkskrankheit.*

Welche Vorteile vers primär systemische Ch

Die neuesten Ergebnisse vom 24. San-Antonio-Breast-Cancer-Symposium im Dezember 2001 wurden am 16./17.02.02 auf einer Veranstaltung der Aventis Pharma in Rottach-Egern am Tegernsee für zahlreiche interessierte Daheimgebliebene noch einmal aufbereitet. Unter anderem wurden Studiendaten präsentiert, die den therapeutischen Nutzen einer präoperativen (neoadjuvanten) Chemotherapie unter Einbeziehung von Docetaxel (Taxotere®*) bei Mammakarzinom-Patientinnen belegen (Abb. 1).



Das Taxan gilt gegenwärtig als eine der wirkungsvollsten Einzelsubstanzen in der Behandlung von Patientinnen mit Mammakarzinomen.

Gegenwärtiger Stand der präoperativen Chemotherapie

Selbst in der Behandlung von Patientinnen mit operablem Mammakarzinom gewinnt die primär systemische Chemotherapie zunehmend an Bedeutung. Als Vorteile dieser Vorgehensweise gelten:

- Die Bekämpfung von (Mikro-)metastasen erfolgt zum frühestmöglichen Zeitpunkt;

- Die Wirksamkeit einer Chemotherapie kann zunächst klinisch dann allerdings auch – nach der Operation – direkt pathologisch beurteilt werden;
- Mit der Verringerung der Größe des Primärtumors erhöht sich die Chance auf eine brusterhaltende Operation.

Der noch relativ junge Standard in der präoperativen Chemotherapie besteht darin, in vier Zyklen Doxorubicin/Cyclophosphamid (AC) zu verabfolgen. Dieses Schema beruht auf Ergebnissen einer Studie des amerikanischen National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project (NSABP B-7).

* Hersteller: Aventis Pharma Deutschland GmbH, 65796 Bad Soden.

hormo

1-8

2 B
2582 X