

**344 Aktuell**

- 344 Neue Behandlungsstrategien bei IgE-vermittelter Allergie
- 344 Charakterisierung einer Zellpopulation in der Haut von Neurodermitikern
- 345 Kann die Einwirkzeit der Bade-PUVA-Therapie verkürzt werden?
- 346 Pestwurz bei Heuschnupfen – Therapiealternative zu Antihistaminika
- 346 Inzidenz der Erythrodermie in den Niederlanden
- 347 Gram-negativer Fußinfekt – Eine Auswertung von 123 Fällen
- 348 Einfluss der Umwelt auf die Entwicklung von Neurodermitis in den ersten Lebensjahren
- 348 Preisverleihung
- 349 Stillen und der Ausbruch eines atopischen Ekzems im Kindesalter – Metaanalyse prospektiver Studien
  
- 350 Online
- 350 Website: The Internet Dermatology Society
- 350 Allergene in Schutzhandschuhen



Schützt Stillen vor atopischem Ekzem im Kindesalter? (siehe Seite 349).

**343 Editorial**

- 343 Immodulation aus der Tube  
*T. Bieber*
  
- 351 Originalarbeiten
- 351 Anwendungsbeobachtung der aktivkohlehaltigen Wundauflage Actisorb® bei 12 444 Patienten mit chronischen Wunden  
*R. Stadler, K. Wallenfang*
  
- 355 Kontaktallergie auf chirurgisches Nahtmaterial  
*B. M. Hausen, P. Mohr*
  
- 359 Okklusionstherapie ausgedehnter Keloide im Kindesalter  
*G. Wagner*

**343 Editorial**

- 343 Immodulation Out of the „Tube“  
*T. Bieber*
  
- 351 Originals
- 351 Survey of 12 444 Patients with Chronic Wounds Treated with Charcoal Dressing (Actisorb®)  
*R. Stadler, K. Wallenfang*
  
- 355 Contact Allergy to Surgical Suture Material  
*B. M. Hausen, P. Mohr*
  
- 359 Treatment of Severe Keloid Formation in Childhood by Using Occlusive Dressing  
*G. Wagner*