


405 Referiert und kommentiert

- 405 Gonokokken und Chlamydien: Infektionen bleiben häufig unerkannt
- 410 Spontane perirenale Blutung: Tumor die häufigste Ursache
- 412 Lokalisiertes Prostatakarzinom: Kein erhöhtes Rezidivrisiko bei nervertretender Operation
- 413 Harnleitersteine: Ureterskopie ist kosteneffektivste Behandlungsmethode
- 415 Uroquiz
- 418 Tipps und Tricks
- 420 Klassische Arbeiten
- 422 Online aktuell
- 424 Aus der Rechtsprechung
- 427 Fragen für den Facharzt
- 430 Qualitätsmanagement



Fast 8% der untersuchten Erwachsenen waren unerkannt mit *Neisseria gonorrhoeae* und *Chlamydia trachomatis* infiziert. Ob aber Screeningprogramme sinnvoll sind, um asymptomatische Infektionen zu erfassen, ist unklar: Seite 405.

435 Übersicht

- 435 Genitale Infektionen mit humanen Papillomaviren (HPV)  
*H. Büttner, D. Jocham, A. Böhle*
- 442 Klinische Originalarbeiten
- 442 Interdisziplinäres Therapiemanagement urogenitaler Rhabdomyosarkome im Kindesalter  
*S. Siemer, J. Lehmann, U. Humke, T. Krenn, H. Reinhard, N. Graf, T. Venzke, G. Schneider, T. Loch, M. Stöckle*
- 448 Tethered Vagina Syndrome – Erfahrungen mit der chirurgischen Behandlung dieses Krankheitsbildes  
*A. Fischer, S. Zachmann, G. Hoffmann*

435 Review

- 435 Genital Infections Caused by Human Papillomaviruses (HPV)  
*H. Büttner, D. Jocham, A. Böhle*
- 442 Clinical Original Papers
- 442 Urogenital Rhabdomyosarcomas in Childhood: An Interdisciplinary Approach  
*S. Siemer, J. Lehmann, U. Humke, T. Krenn, H. Reinhard, N. Graf, T. Venzke, G. Schneider, T. Loch, M. Stöckle*
- 448 Tethered Vagina Syndrome – Experience with Surgical Treatment  
*A. Fischer, S. Zachmann, G. Hoffmann*