

Aus dem Inhalt

Medizin

Topfit im Belastungs-EKG

Die wichtigsten Regeln im Überblick. 4

Leukämie von der Gentherapie

Wie riskant ist der Eingriff ins Genom? 5

Vertrackter Sparzwang

Womit liebe Patienten die Budgets verwechseln. 7

Schlank statt Diabetes

Fettblocker besänftigt die Bauchspeicheldrüse. 8

Supergymnastik für Bildschirmtäter

Gähnen & Co. öffnen die Augen. 10

Sex-Hilfen nach Rektum-Op.

Wie die Manneskraft trotzdem funktioniert. 11

Impressum

..... 12

Claudicatio aus der Wirbelsäule

Wann die Gefäße unschuldig sind. 22

Grippe-Impfung schmackhaft machen.

Wie MT-Kolumnist Dr. Michael Drews auch hartnäckige Impfmuffel überzeugt. 30

Politik und Perspektiven

6,5 Mrd. Euro Mehrbedarf

Regierung will innovative

Das Maß ist voll

Wir sind doch keine Sündenböcke für d

Angesichts der drastischen Sparpläne platzte einem Kollegen aus Offenburg der Kragen und er sandte einen offenen Brief an Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt:

Sehr geehrte Frau Ministerin!
Was Sie sich ausgedacht haben ist eine bodenlose Frechheit, die ich bisher in einem demokratischen Rechtsstaat nicht für möglich gehalten hätte: Als einziger Berufsgruppe wollen Sie den niedergelassenen Ärzten eine Nullrunde aufzwingen,

nachdem schon seit Jahren den Ärzten durch zahlreiche Reglementierungen und Budgetierungen Vorleistungen auferlegt worden waren. Vorwiegend die Ärzte und Krankenhäuser sollen jetzt eine Suppe auslöfeln, die die Regierungen Schröder und vor allem Kohl/Seehofer eingebrockt haben. Erwähnt seien nur die Stichworte „Verschiebebahnhof“ und „kassenfremde Leistungen“ die allein schon zum Wegfall bei den Einnahmen in zweistelliger Milliardenhöhe geführt haben und Milliarden an Mehrausgaben zur Folge hat-

Zusammensetzung: Tamiflu® 75 mg Hartkapseln: Jede Kapsel enthält 98,5 mg Osetamivirphosphat, entsprechend 75mg Osetamivir. Sonstige Bestandteile: Maisstärke, Talk, Povidon, Croscarmellose-Natrium, Natriumstearylfumarat, Gelatine, Eisenoxid-hydrat (E 172), Eisen (III)-oxid (E 172), Eisen (II,III)-oxid (E 172), Titandioxid (E 171), Schellack, Indigocarmin (E 132). Tamiflu® 12 mg/ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen: Jede Flasche enthält 1,182 g Osetamivirphosphat, entsprechend 12 mg/ml Osetamivir nach Zubereitung. Sonstige Bestandteile: Sorbitol (E 420), Natriumdihydrogencitrat (E 331(a)), Xanthan-Gummi (E 415), Natriumbenzoat (E 211), Saccharin-Natrium (E 954), Titandioxid (E 171), Aroma. **Anwendungsgebiete:** Behandlung der Virusgrippe (Influenza) bei Erwachsenen und Kindern ab 1 Jahr mit influenzaatypischen Symptomen und/oder Vorbeugung der Virusgrippe (Influenza) bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 13 Jahren nach Kontakt mit einem klinisch diagnostizierten Influenzafall, wenn das Influenzavirus in der Bevölkerung auftritt. In Ausnahmesituationen (z.B. bei einer Diskrepanz zwischen zirkulierenden und im Impfstoff enthaltenen Virusstämmen und in einer pandemischen Situation) kann eine saisonale Prophylaxe mit Tamiflu® bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 13 Jahren erwogen werden. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit (Allergie) gegenüber Osetamivir oder einem der sonstigen Bestandteile. **Hinweise:** Tamiflu® ist nur gegen Erkrankungen, die durch Influenzaviren verursacht werden, wirksam. **Schwangerschaft/Stillzeit:** Nutzen/Risiko-Abwägung. **Niereninsuffizienz:** Dosisanpassung empfohlen bei Patienten mit Kreatinin-Clearance >10 bis ≤ 30 ml/min; bei Patienten mit Kreatinin-Clearance <10 ml/min und dialysepflichtigen Patienten wird Tamiflu® nicht empfohlen. **Erbliche Fructose-Unverträglichkeit:** Tamiflu® 12 mg/ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen enthält Sorbitol. Tamiflu® kann mit Paracetamol, Ibuprofen oder Acetylsalicylsäure (Aspirin) eingenommen werden; es ist nicht zu erwarten, dass Tamiflu® die Wirkung anderer Arzneimittel beeinflusst. **Nebenwirkungen:** Die häufigsten Nebenwirkungen sind Übelkeit, Erbrechen und Magenschmerzen. Sie treten meist nur nach der ersten Einnahme auf und verschwinden üblicherweise, wenn die Behandlung fortgesetzt wird. Die Häufigkeit dieser Nebenwirkungen wird verringert, wenn Tamiflu® mit Nahrung eingenommen wird. Andere, weniger häufige Nebenwirkungen, die auch durch die Virusgrippe verursacht sein können, sind bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 13 Jahren: Übelkeit, Durchfall, Bronchitis, Schwindel.



Tamiflu®
Osetamivir Influenza A + B

ten. Über sozialen S gesetzbe geplündert Steueraufk werden mü Es sind nen errech chen Min als viel me Politiker au Politik Sür mit dieser ohnehin so tung zum t

Anfas Oh vert