

PHLEBOLOGIE

Minimalinvasive Varizenchirurgie

Effizient, kosmetisch ansprechend und kostengünstig

Durch die Anwendung neu entwickelter Venenextraktoren und die Verwendung von Tumescenzlokalanästhesie ist es möglich, Varizenkonvolute über wenige Hautinzisionen zu extrahieren und intraoperativen Blutverlust und postoperative Schmerzen auf ein Minimum zu reduzieren.

T. Stojanovic, C. Langer, R. Stojanovic **186**

ANGIOLOGIE

Gibt es eine Überdosis Sport?

Angiopathie-Risikofaktor intensiver Ausdauersport

Vieljähriger, intensiver Ausdauersport führt sehr häufig zu einer dilatierenden Arteriopathie, oft mit Mediasklerose, und zu einer dilatativen tiefen Phlebopathie. Personen mit ausgeprägter dilatierender Arteriopathie und Phlebopathie wird von der Fortführung eines intensiven Ausdauersports abgeraten; auch entsprechende angiologische Vorsorgeuntersuchungen sollten in die Betreuung dieses Personenkreises eingebaut werden.

M. Marshall, F. X. Breu **190**

WUNDHEILUNG

Schlecht heilendes Fußgeschwür – der verkannte Fall

Hochmalignes CD30-negatives T-Zell-Lymphom

Anhand des Fallbeispiels eines 72-jährigen Mannes mit einem Ulcus pedis beleuchten wir den Ablauf der Diagnosefindung und mögliche Differentialdiagnosen.

S. Kanya, H.J. Hermanns, G. Gallenkemper, M. Stücker **197**

Der diabetische Fuß – Lokalthherapie

Der diabetische Fuß ist eine spezifische Komplikation im Rahmen des Diabetes mellitus. Verschiedene Pathomechanismen sind involviert. Dazu gehören die diabetische Polyneuropathie, die periphere arterielle Durchblutungsstörung und Infektionen. Ziel ist es, durch zeitgerechte Intervention, lokal und systemisch, die Beinamputationsrate bei diabetischem Fußsyndrom zu reduzieren.

B. Binder **201**

Digitale Wundanalyse – Vorteil für Diagnose und Therapie

Diese Studie stellt eine neue Wunddiagnostiksoftware namens WHAT vor, mit welcher es dem Benutzer ermöglicht wird, Heilungsverläufe anhand der Wundfläche, Wundumfang, Anteilen granulierender, fibrinöser und nekrotischer Wundbezirke mit minimalen technischen Aufwand objektiv zu beurteilen.

K. Sahora, T. Wild, T. Hoelzenbein **204**

RECHT

Das Kompartment-Syndrom – eine seltene, aber folgenschwere Komplikation der Varizenchirurgie, über die aufgeklärt werden sollte

Das Kompartment-Syndrom als schwerwiegende Komplikation nach Varizenchirurgie ist extrem selten und wurde kaum beschrieben. Über diese Komplikation sollte vor einem Eingriff in der Varizenchirurgie aufgeklärt werden. Seine Symptome werden verkannt und therapeutische Maßnahmen meistens zu spät ergriffen. Bleibende motorische Schäden sind die Folge.

K.-J. Paquet

MOSAIK / PRODUKTPROFILE

Ulcus cruris venosum

Kosteneffektive Kompressionstherapie mit einem Vierlagen-Bandagensystem **210**

INFORMATION

Neues aus der Industrie **211**

Buchbesprechung **213**

Termine **215**

Vorschau, Impressum **216**