



Die Histologie zeigt Veränderungen einer leukozytoklastischen Vaskulitis. Die Hautbiopsie stammt aus dem Brustbereich eines Patienten mit Acne vulgaris conglobata. Lesen Sie mehr auf den Seiten 730 ff.



Editorial in eigener Sache

cme.springer.de – das neue CME-Portal 717
cme.springer.de – the new CME portal

Übersichten

J. Dissemond · M. Goos · S.N. Wagner
Die Bedeutung von oxidativem Stress in der Genese und Therapie chronischer Wunden 718
The role of oxidative stress in the pathogenesis and therapy of chronic wounds

Originalien

M. Gloor · A. Becker · B. Wasik · E. Kniehl
Triclosan, ein dermatologisches Lokaltherapeutikum 724
Triclosan, a topical dermatologic agent

Farbbildkasuistiken

B. Manz · M. Rytter · M. Mittag · W. Seidel · P. Nenoff
C-ANCA-positive Vaskulitis der Haut und Nieren im Verlauf einer Acne vulgaris conglobata 730
ANCA-positive vasculitis of the skin and kidneys associated with acne conglobata

G. Bormann · K. Preusser · W. Marsch
Arteriovenöse Fistel als seltene Ursache eines Ulcus cruris 735
Arteriovenous fistula: an uncommon cause of leg ulcers

B. Braun · B. Baima · M. Sticherling
Bullöses Pemphigoid 739
Bullous pemphigoid

J. Bohmeyer · A. Achenbach · M. Westenberger · R. Stadler
Thalidomid-Therapie des kutanen Lupus erythematosus 744
Thalidomide therapy of cutaneous lupus erythematosus

Wie lautet Ihre Diagnose?

M. Heyer · A.v. Stemm · W. Meigel
Bandförmige Alopezie an der Stirn-Haar-Grenze 749
Band-like alopecia at the forehead-hair boundary