


# INHALT



Depressionen im Alter sind ein oft zitiertes Problem in der Geriatrie. Auf welche Zeichen muss man achten, welche Abklärungen sind unbedingt erforderlich, welche Therapie ist geeignet?

Seite 22



Miktionsstörungen sind meist durch eine benigne Prostatahypertrophie verursacht. Oft bleibt dann nur noch die Operation. Der 5-alpha-Reduktasehemmer Finasterid gibt berechnete Hoffnung, dass der Schritt zum Schnitt um einige Zeit verzögert werden kann.

Seite 27

## ÜBERSICHT

Depressionen: Antidepressive Therapie im Alter. Prof. Dr. med. Franz Müller-Spahn, Basel	22
Prostatahyperplasie: Benignes Prostata-Syndrom ist häufigste Ursache für Miktionsstörungen. Prof. Dr. med. Klaus Höfner, Oberhausen.	27
Thrombosen: Diagnostik und Therapie von Thrombosen der tiefen Beinvenen. Dr. med. Christina Jeanneret, Basel.	30

## KONGRESS

Inkontinenz: Weg vom Tabu, weg von den Windeln – hin zur aktiven Therapie.	35
Analgesie: Prophylaxe postoperativer Schmerzen – das richtige Timing ist entscheidend.	36

## JUNGE GERIATER

Irrungen und Wirrungen in der Geriatrie – ein lehrreiches Fallbeispiel. Hannes Balmer, Eva Gerber-Glur, Bern	38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

## SONDERBERICHT

Behandlung der Kniearthrose.	44
------------------------------	----

## BUCHREZENSIONEN

Das Geschäft mit dem Tod.	46
Diabetes im Alter.	46
Welche Farbe hat der Montag?	46

## WEITERE RUBRIKEN

Pharma News.	48
Impressum.	51