

32**Diagnostik Heparin-induzierter Thrombozytenantikörper**

Bei Verdacht auf eine Heparin-induzierte Thrombozytopenie ist eine rasche Bestimmung der Thrombozytenantikörper entscheidend. MEYER O. et al. stellen dazu ein neues Testverfahren vor.

33**Schwere Lungenembolien nach Flugreisen**

LAPOSTOLLE F. et al. untersuchten den Zusammenhang zwischen der Länge einer Flugreise und der Inzidenz thromboembolischer Ereignisse. In ihre Auswertung nahmen sie insgesamt 170 Patienten auf, die mit Verdacht auf Lungenembolie nach der Landung auf dem Charles de Gaulle Flughafen in Paris in ein dortiges Krankenhaus eingewiesen worden waren.

34**Niedermolekulares Heparin als Begleitmedikation bei Colitis ulcerosa**

Niedermolekulare Heparine können bei Patienten mit Colitis ulcerosa nicht nur im Sinne der Thromboseprophylaxe, sondern auch hinsichtlich einer Besserung der Krankheitssymptomatik Vorteile bringen. TÖRKVIST L. et al. untersuchten zwölf Patienten mit therapierefraktärer Kolitis.

35**Thromboembolieprophylaxe bei Wirbelsäulenfrakturen mit Rückenmarksverletzungen**

An einem Kollektiv von 166 Patienten mit Wirbelsäulenfrakturen verglichen LOHMANN U. et al. die Wirksamkeit von unfraktioniertem und niedermolekularem Heparin zur Thromboembolieprophylaxe.

36**Forum/Leserbriefe****43****Kongresse – Termine**