

mycoses

Diagnosis, Therapy and Prophylaxis of Fungal Diseases

Official Publication of Deutschsprachige Mykologische Gesellschaft

VOLUME 46

FEBRUARY 2003

NUMBER 1-2

CONTENTS/INHALTSVERZEICHNIS

EDITORIALS

- J. Müller.** Editorial 1
- H. C. Korting.** Total quality management in dermatomycology in Germany
Totales Qualitätsmanagement in der Dermatomykologie in Deutschland 2

HOMAGE

- Homage to Libero Ajello 5

ORIGINAL ARTICLE/ORIGINALARBEITEN

- W. J. Middelhoven.** Identification of clinically relevant *Trichosporon* species
Identifizierung von *Trichosporon*-Arten mit klinischer Bedeutung 7
- I. Vennewald, J. Schönlebe, E. Klemm.** Mycological and histological investigations in humans with middle ear affections
Mykologische und histologische Untersuchungen bei Patienten mit Mittelohr-Affektionen 12
- N. Bakare, V. Rickerts, J. Bargon, G. Just-Nübling.** Prevalence of *Aspergillus fumigatus* and other fungal species in the sputum of adult patients with cystic fibrosis
Häufigkeit von *Aspergillus fumigatus* und anderen Pilzen im Sputum von erwachsenen Mukoviszidose-Patienten 19

- H. Wei, W. Hai, L. Wanqing.** Clinical study on liposomal amphotericin B (Ambisome®) in deep fungal infections in China
Klinische Studie über liposomales Amphotericin B (Ambisome®) bei tieflokalisierter Pilzinfektionen in China 24

- C. E. Ficker, J. T. Arnason, P. S. Vindas, L. P. Alvarez, K. Akpagana, M. Gbéassor, C. De Souza, M. L. Smith.** Inhibition of human pathogenic fungi by ethnobotanically selected plant extracts
Hemmung humanpathogener Pilze durch ethnobotanisch ausgewählte Pflanzenextrakte 29

- N. Aste, M. Pau, N. Aste, P. Biggio.** Tinea pedis observed in Cagliari, Italy, between 1996 and 2000
Tinea pedis in Cagliari, Italien, zwischen 1996 und 2000 38

CASE REPORTS

- G. Mathew, M. Smedema, L. J. Wheat, M. Goldman.** Relapse of coccidioidomycosis despite immune reconstitution after fluconazole secondary prophylaxis in a patient with AIDS
Fallbericht. Coccidioidomykose-Rückfall trotz Immunrestitution nach Fluconazol-Sekundärprophylaxe bei einem AIDS-Patienten 42