

## Aus dem Inhalt

### Medizin

#### Richtschnur für schwache Herzen

Wie viel Therapie braucht die Insuffizienz? ..... 3

#### Wahn aus der Drüse

Nicht nur Depressive zum TSH-Test. .... 5

#### Warten oder schneiden beim Prostata-Ca.?

Die richtige Strategie für den Mann. .... 8

#### Sprengung im Gallensteinbruch

Wie Konkremente vor 25 Jahren mobilisiert wurden. .... 16

#### Attestwut geheilt

MT-Kolumnist Dr. Michael Drews kennt seine Schüler. .... 21

#### Impressum ..... 26

#### Hut gegen Kugel

Atemzauber für liebe Patienten. .... 28

#### Gelenkzerstörung ausgebremst

Zytokinblockade hält Rheumakranke mobil. .... 30

### Politik und Perspektiven

#### Unsittliche Rezept-Wünsche

Selbst Basteln soll der Hausarzt verschreiben. .... 17

#### Weniger Häuptlinge, nichts gespart

KV-Vorstand verdient am Reisen. .... 17

# Komatöse Mutter soll endlich sterben Schluss mit dem PEG-Wahn

Zum Beitrag „Sohn möchte komatöse Mutter sterben lassen – Darf die Patientin verhungern?“, MT 46/02, S. 29

An MEDICAL TRIBUNE

Ich kann sehr gut die Nöte des Sohnes und des Hausarztes verste-

hen, wenn eine Patientin über mehrere Monate oder Jahre mittels PEG am Leben gehalten wird. Auch ich musste bereits bei mehreren Patienten die traurige Erfahrung machen, dass Patienten mit Zustand nach Massenblutung oder anderen nicht mehr lebenswürdigen Erkrankun-

## Tetra-Gelomyrtol®

– schnell wieder obenauf!

- Bei bakterieller Sinusitis und Bronchitis
- Synergistisches Wirkprinzip



ERSTATTUNGSFÄHIG

**Tetra-Gelomyrtol®.** Verschreibungspflichtig. **Zus.:** 1 Kps. enth.: 250 mg Oxytetracyclin-HCl, 300 mg Myrtol stand. auf mind. 75 mg Limonen, 75 mg Cineol, 20 mg  $\alpha$ -Pinen. **Hilfsst.:** Gelbes Wachs; Rüböl; Sojalecithin; Gelatine; Glycerol 85 %; Mannitol, Sorbitan u. Polyole; Farbst. E 171; E 124; E 172 u. E 131. **Anw.-Geb.:** Akute Bronchitis u. Sinusitis. **Gegenanz.:** Überempfindlichk. gegen einen d. Bestandt. des Arzneim. Schwere Leber- u. Nierenfunktionsstör.; nur vitale Indikation bei Gravidität, Stillzeit u. Kdrn. unter 8 Jahren. **Nebenw.:** Selten gastrointest. Stör. (Nausea, Diarrhö, Dysphagie, Meteorismus, Sodbrennen, Mund- u. Rachenschleimhautentzünd.), Allergien u. anaphylaktoide Reaktionen, Photodermatosen; sehr selten Leukopenien, Thrombopenien, Anämien, Leukozytosen, atypische