

Wie Sie Fatigue- 29 Patienten aufrichten

Mehr als zwei Drittel aller Krebspatienten leiden an Antriebslosigkeit, Erschöpfung und depressiver Stimmung – selbst dann, wenn der Tumor erfolgreich behandelt wurde. Lesen Sie, wie Sie dem Fatigue-Patienten wieder zu neuer Lebenskraft verhelfen.

35 Tumorpatient will nicht essen



Foto: Science Photo Library/Focus

Schon der Anblick von warmen Essen löst Ekel aus. Und der Mund ist – durch die Chemotherapie – so trocken, dass Schlucken kaum möglich ist. Wir verraten Ihnen ein paar Tricks, mit denen Sie Tumorpatienten die Nahrungsaufnahme doch wieder schmackhaft machen.

Was wird aus den Hausärzten? 53

Drei Jahre soll die internistische Weiterbildung für den zukünftigen „Facharzt für Innere und Allgemeinmedizin“ dauern. Das ist zuviel, wettern die Allgemeinärzte. Den Internisten ist's zu wenig.

40 — Diagnostik und Therapie der Alkoholabhängigkeit

Hausarzt spielt als Case-Manager zentrale Rolle

Übersicht von M. Soyka, München

MMW-Seminar Bluthochdruck

45 — Differenzialtherapie der Hypertonie bei Herzerkrankungen

Von N. Werner, M. Böhm, Homburg-Saar

50 — Diagnose-Quiz

Raucher mit Atemnot: Auf Umwegen zur Diagnose

Von P. Stiefelwagen, Hachenburg

UNTERNEHMEN ARZTPRAXIS

53 — Die Kollegen Funktionäre haben sich in den Haaren

Was soll bloß aus den Hausärzten werden?

55 — Ärzte-Präsident will Regierung zuvorkommen

Bürokratie-Schub aus den eigenen Reihen?

55 — Standpunkt

Die Krawallmacher der Kassen

RUBRIKEN

16 — Meldungen

50 — Impressum

58 — Pharmaforum

BEIHEFTER

Sonderbericht: PDE-5-Hemmer mit verbesserter Pharmakokinetik (S. 56)

CONTENTS IN ENGLISH

MMW-Fortschritte der Medizin

Articles in German – Abstracts in German and English

Vol. 145 · No. 11 · March 13 2003

H. S. FÜEBL

Extreme Weariness, Loss of Appetite and Depression. Is this the Price of Effective Cancer Treatment? 151

K. WEIGANG-KÖHLER

Fatigue in Tumor Patients 152

K.-H. KRUMWIEDE

Malnutrition in Tumor Patients – Possibilities and Limits of Oral Alimentionation 157

M. SOYKA

Medical Treatment of Alcohol Dependency in the Doctor's Office 162


N. WERNER, M. BÖHM

Differential Treatment of Hypertension in Heart Disease 167



Hypertriglyceridämie beim Typ 2-Diabetiker.

Frühzeitig
die Weichen
richtig stellen.



Lipo-Merz® retard

Etofibrat. Von Beginn an.

Weitere Informationen unter www.merz.de

