

**Infektionen**

Latente Tuberkulose – Handeln!	<i>N Engl J Med</i>	30
Grippe-Saison: Altenheimbewohner besonders gefährdet	<i>J Gerontol</i>	30
Serratia in der Intensivstation: verunreinigtes Narkotikum als Infektionsquelle	<i>N Engl J Med</i>	30

**Neurologie**

Kriterien zur Parkinson-Diagnose: Hat dieser Patient wirklich Parkinson?	<i>JAMA</i>	32
Idiopathische Geschmackstörung: Alpha-Liponsäure kann Symptome bessern	<i>Int J Oral Maxillofac Surg</i>	32

**Onkologie**

Steroidaler Aromatasehemmer schont die Knochen	<i>Symp.</i>	34
Kühler Kopf verhindert Haarausfall bei Chemotherapie	<i>Support Care Cancer</i>	34
Ösophaguskarzinom: Jede Operationstechnik hat ihre Vorzüge	<i>N Engl J Med</i>	35
Kolorektales Karzinom: Kombinierte Chemotherapie mit Synergie-Effekt	<i>J Clin Oncol</i>	35
steno steno steno steno		34

**Sucht**

Alkoholabhängigkeit: möglichst viele möglichst früh erreichen	<i>Symp.</i>	36
Cannabis ist doch nicht harmlos	<i>BMJ</i>	36
Nikotinsucht: Medikamentöse Hilfen für Abstinenz-Willige	<i>JAMA</i>	36

**Umweltmedizin**

Dengue-Fieber: Ausbreitung durch Erderwärmung	<i>Lancet</i>	37
Vergiftung durch Pestizide: Bauern in Entwicklungsländern gefährdet	<i>Lancet</i>	37
Arsen im Reis	<i>Lancet</i>	37
Handy und Gehirnaktivität	<i>Int J Radiat Biol</i>	37

MED-INFO 38

Impressum 30

Bestellcoupon 39

**Was bedeuten die Symbole?**

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>A</b> Anwendungsbeobachtung | <b>M</b> Metaanalyse                       |
| <b>F</b> Fall-Kontroll-Studie  | <b>R</b> Randomisiert-kontrollierte Studie |
| <b>F</b> Fallbericht           | <b>S</b> Sonstige Studienarten             |
| <b>K</b> Kohortenstudie        | <b>U</b> Übersicht                         |

**Unterschiedlich lange Konsultationen**

Die meisten Patienten sind zwar zufrieden mit dem Hausarzt. Viele empfinden jedoch die Konsultationen als zu kurz.

Die durchschnittliche Zeit, die der Hausarzt mit einem Patienten im Sprechzimmer verbringt, beträgt 7,6 min in Deutschland, 7,8 in Spanien, 9,4 in England, 10,2 in den Niederlanden, 15 in Belgien, 15,6 in der Schweiz.

Die Ärzte nehmen sich mehr Zeit, wenn sie psychosoziale Probleme vermuten. Je älter die Patienten sind, desto länger dauern die Konsultatio-

nen. Frauen sind meistens länger in den Sprechzimmern als Männer. Je höher die Arbeitsbelastung des Arztes ist, desto kürzer fallen die Konsultationen jedoch aus.

Die Dauer der einzelnen Konsultationen steht in keinem Zusammenhang mit der Erfahrung des Hausarztes. (MO)

**S** Deveugele M et al.: *Consultation length in general practice: cross sectional study. BMJ* 325 (2002) 472-474  
 ✕ Bestellnr. der Arbeit 024124

**Die Angst vor dem HIV-Stich**

Wie geht medizinisches Personal mit dem Risiko einer HIV-Übertragung durch Blut um?

55 im medizinischen Bereich Beschäftigte waren mit Körperflüssigkeiten HIV-infizierter in Kontakt gekommen. Bevor ihnen das Ergebnis des HIV-Tests mitgeteilt wurde, wurde ein Angsttest durchgeführt. Höheres Lebensalter und der Arztberuf erwiesen sich als Vorhersagefaktor für ein geringeres

Angstniveau. Je höher das Infektionsrisiko eingeschätzt wurde, desto größer war die Furcht davor. – Die Tests waren in allen Fällen HIV- und HCV-negativ. (DS)

**K** Meienberg F et al.: *Anxiety in health care workers after exposure to potentially HIV-contaminated blood or body fluids. Swiss Med Wkly* 132 (2002) 321-324  
 ✕ Bestellnr. der Arbeit 023981

**DAZUGELERNT**

