

ÄRZTE ZEITUNG

ZB MED



DIE TAGESZEITUNG FÜR ÄRZTE

FRITAG 1. APRIL 2003

D 8877 NR. 61 JAHRGANG 22



Zuviele Kilos machen Kinder krank

In einer Studie hatten fast sieben Prozent der adipösen Kinder und Jugendlichen einen gestörten Glukosestoffwechsel. 37 Prozent hatten eine Hypercholesterinämie.

MEDIZIN 11



Ohne ärztlichen Auftrag geht es nicht

Grundsätzlich dürfen Arzthelferinnen nur nach einem Auftrag ihres Chefs tätig werden – auch wenn in den Praxen oft anders gearbeitet wird.

WIRTSCHAFT 17



Sektion im Theatrum Anatomicum

1656 bekam Rembrandt den Auftrag, einen Chirurgen während einer Anatomievorlesung zu malen. Das Bild ist jetzt in einer Ausstellung in Frankfurt/Main zu sehen.

KULTUR/GESELLSCHAFT 19

DES TAGES Anziehen trotz Antikoagulation

Vor Zahnextraktionen oder Biopsien braucht nach Ansicht des Wiener Hämatologen Professor Herbert Watzke eine orale Antikoagulation nicht unterbrochen werden, solange die INR-Werte um 2,5 (entspricht INR-Werten von ungefähr 35 bis 20) liegen. Es gebe eine Fülle von Daten, die zeigen, daß das Blutungsrisiko bei chirurgischen Eingriffen trotz Antikoagulation nahezu null sei, sagte Watzke beim Jahreskongreß der Gesellschaft für Thrombose- und Hämostaseforschung in Innsbruck.


GRUND

Inhalierbares Kortikoid hält leichtes Asthma gut in Schach

Mit niedrigdosiertem Budesonid ist Notfalltherapie seltener erforderlich

GENT (ikr). Patienten mit nur leichtem, persistierendem Asthma profitieren von einer frühen Dauertherapie mit niedrigdosiertem, inhalierbarem Kortikoiden: In einer belgischen Studie war die Rate der Patienten, die innerhalb von drei Jahren mindestens einmal eine erhebliche Verstärkung der Symptome hatten, mit inhaliertem Budesonid um 44 Prozent geringer als mit Placebo.

In der Studie erhielten 7241 Pa-



heißt, der Gesundheitszustand hatte sich so sehr verschlechtert, daß eine Notfalltherapie oder eine Krankenhauseinweisung erforderlich wurde. Das berichten Dr. Romain Pauwels und sein Team von der Universitätsklinik in Gent. Außerdem hatten die mit Budesonid behandelten Patienten weniger orale Kortikoide benötigt. Und sie hatten mehr symptomfreie Tage als die Placebo-Gruppe. Auch die Lungenfunktion, beurteilt mit der forcierten expiratorischen Einse-

Lipidstudie mit Nierenkranken wird gestartet



CHICAGO (eb). Ob Patienten mit Nierenerkrankung eine Lipidtherapie nützt, wird erstmals systematisch untersucht. Solche Patienten sind bekanntlich stark gefährdet, an kardiovaskulären Komplikationen zu sterben, aber in großen Studien zur Cholesterinsenkung kaum berücksichtigt wor-

DR. ZENTRALBIBLIOTHEK TEAM 5.1/23
JOSEPH-STEELZIMANN-STR. 9 50931 KÖLN

041441

€ 2,500