

JOURNAL FÜR HYPERTONIE

Nr. 1/2003, 7. Jahrgang

G. Mayer Editorial: ALLHAT-Studie	5
G. Hitzenberger Kausaler Ansatzpunkt Sympathikus: Der Imidazolinrezeptoragonist Moxonidin	7
G. Linß Therapie der chronischen arteriellen Hypertonie und die Rolle der Betablocker	11
M. Hochleitner, A. Bader Herzpatienten und Lebensqualität: Gibt es einen Geschlechtsunterschied?	19
Mitteilungen der Österreichischen Gesellschaft für Hypertensiologie	24
Für Sie gelesen	26
Pharma-News	27
Hinweise für Autoren, Impressum	34

Vorstand der Österreichischen Gesellschaft für Hypertensiologie

Präsident: Univ.-Prof. Dr. Gert Mayer

Sekretär: Univ.-Prof. Dr. Alexander Rosenkranz

Kassier: Univ.-Prof. Dr. Bruno Watschinger

Weitere Vorstandsmitglieder:

Univ.-Prof. Dr. H. Baumgartner

Univ.-Prof. Dr. P. Deetjen

Univ.-Prof. Dr. F. Dienstl

Prim. Univ.-Prof. Dr. H. Drexel

Prim. Univ.-Prof. Dr. B. Eber

Univ.-Prof. Dr. P. Fitscha

Dr. B. Fürthauer

Prim. Univ.-Prof. Dr. D. Geissler

Univ.-Prof. Dr. G. Hitzenberger

Univ.-Prof. Dr. W. H. Hörl

Prim. Univ.-Doz. Dr. H. Hörtnagl

Prim. Univ.-Prof. Dr. T. Kenner

Univ.-Prof. Dr. W. Klein

Prim. Dr. R. Kramar

Univ.-Prof. Dr. W. Lechner

Univ.-Prof. Dr. D. Magometschnigg

Prim. Dr. H. J. Nesser

Dr. Paul Pavek

Prim. Univ.-Prof. Dr. M. Pichler

OA. Dr. H. Pilz

Univ.-Prof. Dr. A. Rieder

Prim. Univ.-Prof. Dr. K. Silberbauer

Prim. Univ.-Prof. Dr. F. Skrabal

Prim. Univ.-Prof. Dr. J. Slany

Univ.-Prof. Dr. R. Zweiker

mepiril® und co-mepiril® by Kwizda, gegen Bluthochdruck: Kurz-Fachinformation: Bezeichnung: mepiril® 5 mg / 10 mg / 20 mg-Tabletten. Zusammensetzung: 1 Tablette enthält 5 mg / 10 mg / 20 mg Enalaprilmaleat. **Hilfsstoffe:** Lactose, vorverkleisterte Stärke, Talkum, Natriumhydrogencarbonat, Hypromellose (5mg), Magnesiumstearat, rotes (10, 20 mg) und gelbes Eisenoxid (E 172) (20 mg). **Anwendungsgebiete:** - Essentielle Hypertonie (aller Schweregrade) oder renovaskuläre Hypertonie. - Als Zusatztherapie bei Herzinsuffizienz zu Diuretika und/oder Digitalis. - Asymptomatische linksventrikuläre Dysfunktion (NYHA I und II). **Gegenanzeigen:** - Überempfindlichkeit gegenüber einem Bestandteil dieses Arzneimittels. - Angioneurotisches Ödem in der Anamnese in Zusammenhang mit einer früheren Behandlung mit einem ACE-Hemmer. - Schwangerschaft. - Stillzeit. **Bezeichnung: co-mepiril®-Tabletten. Zusammensetzung:** 20 mg Enalaprilmaleat und 12,5 mg Hydrochlorothiazid. **Hilfsstoffe:** Natriumhydrogencarbonat, Maisstärke, Maisquellstärke, Lactose, Magnesiumstearat, rotes und gelbes Eisenoxid (E 172). **Anwendungsgebiete:** Essentielle Hypertonie, die mit einem ACE-Hemmer als Monotherapie nicht ausreichend behandelt werden kann. **Gegenanzeigen:** - Anurie. - Überempfindlichkeit gegenüber einem Bestandteil dieses Arzneimittels. - Angioneurotisches Ödem in der Anamnese in Zusammenhang mit einer früheren Behandlung mit einem ACE-Hemmer. - Überempfindlichkeit gegenüber Sulfonamidabkömmlingen. - Stenose der Nierenarterien. - Schwangerschaft. - Stillzeit. **Name oder Firma und Anschrift des pharmazeutischen Unternehmers:** F. Joh. Kwizda Ges.m.b.H., 1010 Wien. **Verschreibungspflicht/ Apothekepfllicht:** Rezept- und apothekenpflichtig. **Wirkstoffgruppe:** Antihypertensiva. Die Informationen zu den Abschnitten Warnhinweise, Wechselwirkungen, Nebenwirkungen und Gewöhnungseffekte sind der veröffentlichten Fachinformation zu entnehmen. Vor Verschreibung beachten Sie bitte den vollständigen Text der Fachinformation. 1) Collins R. et al.: Blood pressure, stroke and coronary heart disease. Lancet 335, 827-838 (1990). 2) The University of Glasgow: Press Release: Study of mortality in patients with high blood pressure has shown that the choice of treatment has a major effect on survival. March 15th 2000.

Kwizda
Pharma