



Bei der chronischen Graft-versus-Host-Disease ist die Haut das am häufigsten betroffene Organ. Die Hautveränderungen treten entweder lokalisiert (in 20%) oder generalisiert (in 80% der Fälle) auf, wie Sie auf den Seiten 465-483 nachlesen können.

## Einführung zum Thema Introduction to the topic

- M. Meurer  
**Calcineurininhibitoren** 404  
 Calcineurin inhibitors

## Leitthema Main topic

*Redaktion: M. Meurer*

- A. Stütz · M. Grassberger · J. G. Meingassner  
**Entstehungsgeschichte und präklinisches Profil von Pimecrolimus** 405  
 Development and pre-clinical aspects of pimecrolimus

- S. Ständer · T. A. Luger  
**Antipruritische Wirkung von Pimecrolimus und Tacrolimus** 413  
 Antipruritic effects of pimecrolimus and tacrolimus

- D. Thaçi  
**Langzeitmanagement des atopischen Ekzems bei Kindern mit Calcineurininhibitoren** 418  
 Long term management of childhood atopic dermatitis with calcineurin inhibitors

- M. Meurer · G. Wozel  
**Behandlung des atopischen Ekzems bei Erwachsenen mit topischen Calcineurininhibitoren** 424  
 The treatment of atopic eczema in adults with topical calcineurin inhibitors

- J. Lübke  
**Klinische Erfahrungen mit topischen Calcineurininhibitoren in der Praxis** 432  
 Practice experience with topical calcineurin inhibitors

## Originalien Original articles

- A. Schäfer · R. A. Herbst · U. Beiteke · S. Lange-Ionescu · H. Treckmann · D. Löhlein  
 G. Thiemann · B. Theophil · E.-W. Schwarze · H.-J. Bartels · P.J. Frosch  
**Schildwächterlymphknotenexzision (SLKE) und Positronen-emissionstomographie (PET). Staginguntersuchungen bei Melanompatienten in den klinischen Stadien I-II (nach DDG): Erfahrungen aus der Hautklinik Dortmund** 440  
 Sentinel lymph node excision (SLNE) and positron emission tomography in the staging of stage I-II melanoma patients

## Kasuistiken Case reports

- T. Karamfilov · M. Buslau · C. Dürr · W. Weyers  
**Pansklerotische Skleroporphyrie nach langjähriger Exposition gegenüber organischen Lösungsmitteln** 448  
 Pansclerotic porphyria cutanea tarda after chronic exposure to organic solvents

- H. Kurzen · W. Hartschuh  
**Benignes zellreiches fibröses Histiozytom der Großzehe mit knöchernen Defekten des Nagelkranzfortsatzes** 453  
 Benign cellular fibrous histiocytoma with erosion of the phalanx