

Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde

- 334 Anatomische Unterschiede der Nervi optici, des Chiasmas und der Tractus optici bei normal- und hypopigmentierten Personen: eine standardisierte MRI- und fMRI-Untersuchung
Barbara Käsmann-Kellner, Thorsten Schäfer, Christoph M. Krick, Klaus W. Ruprecht, Wolfgang Reith, Bernd Ludwig Schmitz
- 334 Anatomical Differences in Optic Nerve, Chiasma and Tractus Opticus in Human Albinism as Demonstrated by Standardised Clinical and MRI Evaluation
Barbara Käsmann-Kellner, Thorsten Schäfer, Christoph M. Krick, Klaus W. Ruprecht, Wolfgang Reith, Bernd Ludwig Schmitz
- *Papillen- und Optikusanomalien sind bei Albinismus häufig. Die anatomischen Auffälligkeiten sind jedoch nicht auf den Sehnervenkopf begrenzt, sondern können über das Chiasma hinausreichen.*
- 345 Motilitätsentwicklung nach modifizierter 3-Wand-Dekompression der Orbita bei endokriner Orbitopathie aus funktioneller und rehabilitativer Indikation
Ulrike H. Grenzebach, Ulrike Schnorbus, Thomas Büchner, Holger Busse, Wolfgang Stoll
- 345 Development of Ocular Motility Following Modified 3-Wall Decompression of the Orbita in Endocrine Orbitopathy for Functional and Rehabilitative Indication
Ulrike H. Grenzebach, Ulrike Schnorbus, Thomas Büchner, Holger Busse, Wolfgang Stoll
- *Klinische Studie zur Analyse postoperativer Diplopieentstehung bei endokriner Orbitopathie durch eine modifizierte Technik der Orbitadekompression bei aktiver und ausgeheilter Erkrankung.*
- 352 **Kasuistiken**
- 352 **Case Reports**
- 352 Plastisch rekonstruktive Korrektur eines persistierenden Lidödems bei Melkersson-Rosenthal-Syndrom
Focke Ziemssen, Jens Martin Rohrbach, Christian Scherwitz, Peter Olliver Denk
- 352 Plastic Reconstructive Correction of Persistent Orofacial Swelling and Swelling of the Eyelids in Melkersson-Rosenthal Syndrome
Focke Ziemssen, Jens Martin Rohrbach, Christian Scherwitz, Peter Olliver Denk
- *Das Melkersson-Rosenthal-Syndrom ist durch die klassische Trias (rezidivierende Ödeme im Orofazialbereich, Fazialisparese, Lingua plicata) gekennzeichnet. Der beschriebene Fall unterstreicht die massive Beeinträchtigung durch progrediente Lidödeme im Rahmen der Erkrankung. Die Verbesserung nach chirurgischer Resektion zeigt, dass eine generelle Zurückhaltung gegenüber rekonstruktiven Maßnahmen nicht angezeigt ist.*
- 357 Langzeitbeobachtung nach einer bilateralen endogenen Klebsiella-Endophthalmitis
Heinrich Holak, Reinhard Becker, Sophie Holak
- 357 Long-Term Follow-Up of Bilateral Endogenous Klebsiella Endophthalmitis
Heinrich Holak, Reinhard Becker, Sophie Holak
- *Für den seltenen therapeutischen Erfolg einer Klebsiella-Endophthalmitis ist eine enge und intensive Zusammenarbeit zwischen Internisten und Ophthalmologen unumgänglich.*
- 362 **Fortbildung**
- 362 **Further Training**
- 362 VIII: Statistik in klinischen Publikationen: Checklisten für Autoren
Frank Krummenauer
- 362 VIII: Statistics in Medical Publications: Check Lists for Authors
Frank Krummenauer
- *Es werden Checklisten für die Autoren klinischer Publikationen hinsichtlich der einzubringenden biometrischen Methodik sowie der zu verwendenden statistischen Maßzahlen zusammengestellt.*
- 366 **Offene Korrespondenz**