

ÄRZTE ZEITUNG

DIE TAGESZEITUNG FÜR ÄRZTE

AG/SAMSTAG 13./14. JUNI 2003

D 8877 NR. 109 JAHRGANG 22



Operation schließt den Spalt in der Hand

Bei Spalthand (Ektrodaktylie) kann ein Eingriff bereits im ersten Lebensjahr nötig sein. Es bestehen gute Aussichten auf gute funktionelle und kosmetische Ergebnisse.


MEDIZIN 11



Sichere Verhütung bis zur Menopause

Hormonale Kontrazeptiva können bis zur Menopause angewandt werden – sofern keine Risikofaktoren oder Kontraindikationen vorliegen, sagt Prof. Cosima Brucker aus Ulm.

DAS WISSENSCHAFTS-JOURNAL



Ein Revolutionär wird vermarktet

Vor 75 Jahren wurde der Mediziner und Revolutionär Ernesto „Che“ Guevara geboren. Der Kämpfer gegen den Kapitalismus wird inzwischen selber weltweit vermarktet.

PANORAMA 20

DES TAGES Zichtserklärung ist mer bindend

Wenn Patienten in einer Individualvereinbarung auf Ansprüche gegen ihren Arzt verzichten, können sie nicht nachträglich ihre Meinung ändern. Diese Vereinbarung ist nach einem Urteil des Oberlandesgerichts Oldenburg (Aktenzeichen: 8 U 206/01) bindend. Im konkreten Fall hatte eine Patientin nach einer mißglückten Schönheitsoperation einen niedergelassenen Chirurgen zur Erstattung der Behandlungskosten und Übernahme der Kosten für die Nachbehandlung auf weitere Ansprüche verzichtet. Als die Nachbehandlung nicht im Sinne lief, verklagte sie den Arzt auf Schadensersatz. Das wies das Gericht ab.

Statin schützt Diabetiker vor vaskulären Komplikationen

Daten von nahezu 6000 Teilnehmern der Heart Protection Study ausgewertet

OXFORD (ikr). Nicht nur Patienten mit normalem Glukosestoffwechsel, die ein hohes Risiko für tödliche Koronar-Ereignisse haben, profitieren von einer lipid-senkenden Therapie. Auch bei Diabetikern wird die Rate schwerer vaskulärer Ereignisse durch einen Lipidsenker um etwa ein Viertel reduziert.

Das ist die Hauptbotschaft einer Substudie (Lancet 361, 2003, 2005)

Weniger schwere vaskuläre Ereignisse mit Statin-Therapie

bei Diabetikern (n = 5963)

Simvastatin 20,2 %

Placebo 25,1 %

bei Nicht-Diabetikern (n = 14573)

Simvastatin 19,5 %

um 22 Prozent. Bei den Nicht-Diabetikern war die Risikoreduktion mit 25 Prozent ähnlich.

Der Clou: Die 2912 Diabetiker, die zu Beginn der Studie noch keine KHK oder eine andere arterielle Verschlusskrankheit hatten, profitierten sogar noch stärker von der Statin-Therapie: Hiermit gab es 135 erste schwere vaskuläre Ereignisse, mit Placebo waren es 196. Das bedeutet eine relative Risikoreduktion um 33 Prozent.



Rechnung hilft beim Marketing

MÜNSTER (msc). GKV-Patienten, die zusätzlich medizinisch sinnvolle Leistungen in Anspruch nehmen und dafür selbst bezahlen, sollten immer eine nachvollziehbare, schriftliche Rechnung für diese individuellen Gesundheitsleistungen (IGeL) erhalten. Darauf hat F.-Arnold Thüning, Chef der PVS Westfalen-Nord, im Gespräch

DT. ZENTRALBIBLIOTHEK TEAM 5.1/23 JOSEPH-STELZMANN-STR. 9 50931 KOELN

041441

2.671

1