

Politik und Perspektiven

Naturheilmittel nur für Selbstzahler?

Ärzte schlagen

Alarm. 22

Hausarzt honorar für Therapeuten ...

KV muss zahlen. 23

Praxisführung und Geld


Impfen zahlt sich für Sie aus

Hausarzt beweist's mit Kalkulation! 31

Blechen für Unfall der HelferIn

Was tun, wenn die HelferIn ihr eigenes Auto beim Hausbesuch zu Schrott fährt? 34

Mit dem Passwort doc finden Sie in www.medical-tribune.de spezielle Informationen für Ärzte.



Nebilet®. Wirkstoff: Nebivololhydrochlorid. **Verschreibungspflichtig. Zusammensetzung:** 1 Tablette enthält: Nebivololhydrochlorid 5,45 mg (entspr. 5 mg Nebivolol); sonstige Bestandteile: Polysorbat 80, Methylhydroxypropylcellulose, Lactose-Monohydrat, Maisstärke, Croscarmellose-Natrium, mikrokristalline Cellulose, hochdisperses Siliciumdioxid, Magnesiumstearat. **Anwendungsgebiete:** Essentielle Hypertonie. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen Nebivolol, Leberinsuffizienz oder Einschränkung der Leberfunktion, kardiogener Schock, unbehandelte Herzinsuffizienz, Sick-Sinus-Syndrom einschließlich SA-Block, Überleitungsblöcke 2. und 3. Grades, Bronchospasmen und Asthma bronchiale in der Anamnese, unbehandeltes Phäochromozytom, metabolische Acidose, Bradykardie (Herzfrequenz unter 50 Schlägen pro Minute), Hypotonie, schwere periphere Durchblutungsstörungen, Schwangerschaft, Stillzeit. **Hinweis:** Vorsicht bei peripheren Durchblutungsstörungen, AV-Block 1. Grades, Prinzmetal-Angina, chronisch obstruktiven Atemwegserkrankungen, Psoriasis in der Anamnese, Hyperthyreose (Maskierung der Tachykardie-Symptome), Diabetikern (Maskierung der Hypoglykämie-Symptome). Für die Anwendung bei Kindern keine ausreichenden Erfahrungen. **Nebenwirkungen:** Gelegentlich Kopfschmerzen, Schwindel, Müdigkeit, Parästhesien, Diarrhoe, Obstipation, Übelkeit, Dyspnoe, Ödeme; selten Bradykardie, verlangsamte AV-Überleitung/AV-Block, Hypotonie, Herzinsuffizienz, (Verstärkung einer) Claudicatio intermittens, Sehstörungen, Impotenz, Depressionen, Alpträume, Verdauungsstörungen, Flatulenz, Erbrechen, Bronchospasmen, Hautreaktionen. Bei einigen β -Rezeptoren-Blockern wurde berichtet über Halluzinationen, Psychosen, Verwirrung, kalte/zyanotische Extremitäten, Raynaud-Syndrom, trockene Augen, oculo-mucocutane Toxizität vom Practolol-Typ. Erhöhung der Empfindlichkeit gegenüber Allergenen und der Schwere anaphylaktischer Reaktionen. BERLIN-CHEMIE AG, 12489 Berlin. (Stand 11/99)

Wegen der Pille Apotheker vergrault mir Patientin

Zu Dr. Drews' Kolumne „Krebsverdacht und Milchverbot – Apotheker pfuschen mir ins Handwerk!“, MT 20/03, S. 31

An MEDICAL TRIBUNE

Eine meiner Patientinnen holt in der Apotheke im EG des Hauses eine Dreimonatspackung eines Ovulationshemmers. Diesen nimmt die Patientin seit Jahren zur völligen Zufriedenheit ein.

Apotheker (stirnrunzelnd) das Rezept betrachtend: „Da hätte ich was viel besseres für Sie!“ Patientin

(neugierig): „Was denn, Herr Doktor? (Apotheker ist promoviert.) „Diane!“

Patientin in die Praxis zurückkommend: „Der Herr Apotheker meint, Diane wäre besser für mich. Warum haben Sie mir das nie gesagt?“ Meine Antwort: „Wer ist hier der Frauenarzt?“ (vielleicht psychologisch falsch). Patientin (abrausend): „Das muss ich überlegen, ob ich bei Ihnen Patientin bleibe.“ (kam nie wieder!).

Dr. Ulfert Schweckendieck
Frauenarzt, Ottobrunn

Ko
be
An M
Dise
deckel
selbst
Zweifel
fung vo
gramm
struktu
hen? I
werden
Krankh
nen, do
sen wei
den Na
cherter
mit G
ausglei
AOK's
senwet
eben j
Milliar
durch
herein
Die
für jed
nagten
erstell
und ev
Ich ha
Stück.
für Di
250 Bl
den K
müsse
dertta
Das e
Millio