



Titelbild:
Sentinel node-Biopsie: Neuere Op.-Verfahren sollen helfen, die Ausräumung der Lymphknoten aus der Achselhöhle zu reduzieren. Nur die zuerst befallenen Wächterlymphknoten werden entfernt. Die nicht befallenen werden nicht herausgenommen. Dadurch können Nebenwirkungen wie z.B. Ansammlung von Lympflüssigkeit im Arm deutlich verringert werden. Mehr dazu im Leitthema dieses Heftes (Bilder mit freundlicher Genehmigung von Hoffmann-La Roche).

Gestaltung: deblik, Berlin

Onkologie aktuell

- A. Junker · U. Bischof
Was ist die optimale Therapie des primären Mammakarzinoms?
 8th International Conference on Primary Therapy of Early Breast Cancer **668**
- H. Balogh
„Durch die Brust ins Herz“. Neue Kampagne für Brustkrebspatientinnen **675**
- Off-Label-Use.** Internet-Diskussion am Virtuellen Runden Tisch **676**

Weiterbildung - Zertifizierte Fortbildung

- A. Pfeleiderer
Gutartige Ovarialtumoren und Borderline-Tumoren **678**

Verschiedenes

- Buchbesprechungen** **617, 654**
- Fachnachrichten** **602, 618, 624, 631, 649**
- Termine** **701**
- Vorschau** **704**



cme.springer.de – das Zertifizierungsportal

Zertifizierte Fortbildung der Springer-Facharztzeitschriften mit neuer Funktionalität

- Beiträge und Fragen sowie Informationen rund um CME
- Einfache Benutzerführung – auch für Internet-Neulinge
- Teilnahmebestätigungen können online abgerufen werden
- Personalisiertes Archiv Ihrer Ergebnisse
- Hohe Sicherheit durch verschlüsselte Datenübertragung (SSL)

Zertifiziert von der Landesärztekammer Hessen und der Nordrheinischen Akademie für ärztliche Fort- und Weiterbildung.