


MYKOSEN



Wegen des zunehmenden Einsatzes moderner Immunsuppressiva wird eine suffiziente Therapie von Mykosen immer wichtiger. Die erfolgreiche Behandlung setzt allerdings eine differenzielle Diagnostik und die Bestimmung der Spezies voraus.

ab Seite 30

Diagnostik

An der Bestimmung der Spezies führt kein Weg vorbei30

Malassezia-Hefen

Spaghetti mit Fleischklößchen und Hobelspanphänomen34

Tinea capitis

Kinder, Katzen und Kopfhaut38

Topische Therapie

Tinea pedis – mit dem Antimykotikum auf guten Fuß.....40

Onychomykose

Erst nachweisen, dann therapieren.....40

Kosten

Wirtschaftlichkeit in der topischen Therapie43


Tipps

Patienten-Information zu Hautpilzkrankungen44

ÄP-Service

Fachbücher, Patienten-Ratgeber und Internet-Adressen45

Titelbild: Candida albicans



Täglich aktuelle Meldungen aus dem Fachbereich Dermatologie finden Sie auf unserer Homepage unter www.aerztlichepraxis.de

Fotos: GFB, Neubert; Archiv; Titelbild: Hoechst

Vor dem Pflaster Octenisept® Wund-Desinfektion

NEU: Jetzt ohne Altersbeschränkung bei Kindern!

+++ schmerzfrei +++ farblos +++ aus der Apotheke +++ schmerzfrei +++ farblos +++
+++++ www.octenisept.de +++++

+++ Die Erfolgsstory hält an +++
Juli 2000 +++ Testsieger bei „ÖKO-TEST“ im Bereich der Wundbehandlung +++
Juli 2001 +++ Präparat des Jahres – gewählt von deutschen Apothekern +++
August 2002 +++ Lt. BfArM keine Einschränkung bei der Anwendung an Kindern
September 2002 +++ Erneut Testsieger bei „ÖKO-TEST“ im Bereich Wundbehandlung



Schülke & Mayr

Octenisept® Wunddesinfektion ■ **Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Octenidindihydrochlorid 0,1 g, Phenoxyethanol 2,0 g ■ **Sonstige Bestandteile:** (3-Cocosteinsäureamidopropyl)dimethylammonioacetat, Natrium-D-gluconat, Glycerol 85%, Natriumchlorid, Natriumhydroxid, gereinigtes Wasser ■ **Anwendungsgebiete:** Zur wiederholten, zeitlich begrenzten unterstützenden antiseptischen Wundbehandlung ■ **Gegenanzeigen:** Bei Überempfindlichkeit gegen einen der Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile des Arzneimittels. Octenisept Wunddesinfektion sollte nicht zu Spülungen in der Bauchhöhle (z.B. intraoperativ) und der Harnblase und nicht am Trommelfell angewendet werden ■ **Nebenwirkungen:** Als subjektives Symptom kann in seltenen Fällen ein vorübergehendes Brennen auftreten. ■ **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:** Octenisept Wunddesinfektion nicht in größeren Mengen verschlucken oder in größeren Mengen in den Blutkreislauf, z.B. durch versehentliche Injektion, gelangen lassen. Bei Säuglingen sollte Octenisept Wunddesinfektion nur unter ärztlicher Aufsicht angewendet werden.
Pharmazeutischer Unternehmer: Schülke & Mayr GmbH, 22840 Norderstedt

Zum Kennenlernen einfach 50-ml-Muster anfordern!
– Nur eine Anforderung pro Jahr möglich –
Schülke & Mayr GmbH • 22840 Norderstedt
Telefon 040-521 00 666 • www.schuelke-mayr.com

Praxisstempel APD-C-6/03

COUPON

Unterschrift