

IN|FO|NEUROLOGIE &PSYCHIATRIE

Interdisziplinäre Fortbildung in der Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie

EDITORIAL

1 Schlaganfallprävention

Benutzen Neurologen einen „malignen Vasodilatator“?

H.-C. Diener, Essen

JOURNAL SCREEN

6 Affektive Episoden

Erhaltungstherapie bei bipolaren Störungen: Lamotrigin und Lithium wirksam – aber mit unterschiedlichem Profil

P. Nyhuis, Essen

8 Demenz

Wenn Demenzpatienten randalieren: Kann ein Atypikum die Aggressionen beherrschen?

Janine Diehl, H. Förstl, München

10 Kurzreferat

Sexualstörungen unter Atypika: Großes Thema, wenig Fakten

D. Naber, Hamburg

11 Epilepsie

Werdende Mütter mit Epilepsie: Antikonvulsiva gefährden den Feten, Anfälle die Mutter

H.-C. Diener, Essen

12 Kopfschmerz

Migräne als Risikofaktor für den Schlaganfall. Hypertone Raucherin mit Aura besonders gefährdet

H.-C. Diener, Essen

Eletriptan zur Behandlung akuter Migräneattacken: Höher dosiert eine nachhaltig wirksame Alternative

H.-C. Diener, Essen

15 Migränegenetik

Familiär hemiplegische Migräne – Weiteres Migränegen entdeckt

H.-C. Diener, Essen

16 Neurodegenerative Erkrankungen

Euthanasie bei amyotropher Lateralsklerose: Wie dem Todeswunsch begegnen?

A. C. Ludolph, Ulm

18 Neuroonkologie

Intrathekale Chemotherapie? Kontroversen zur Behandlung primärer ZNS-Lymphome

M. Weller, Tübingen

20 Kurzreferat

Unerwünschte Arzneimittelwirkungen – Herzstillstand unter klassischen Neuroleptika

H.-C. Diener, Essen

20 Buchbesprechung

Schlafstörung und Depression

M. Wiegand, München

22 Schizophrenie

Neurokognitive Veränderungen und psychosozialer Outcome: Welchen Einfluss haben atypische Antipsychotika?

D. Sollberger, F. Müller-Spahn, Basel

23 Buchbesprechung

Angststörungen – rasch orientiert

J. Aagenendt, Freiburg i. Br.

24 Schizophrenie

Ergebnisse einer Metaanalyse bei Schizophrenie – Sind niederpotente Neuroleptika und Atypika gleichwertig?

M. Berner, L. Kriston, C. Normann, Freiburg i. Br.

Olanzapin plus Noradrenalin-Wiederaufnahmememmer – Gewichtszunahme deutlich abgemildert

T. Rädler, D. Naber, Hamburg

28 Schlaganfall

Sekundärprophylaxe nach ischämischem Insult: Offenes Foramen ovale birgt kein zusätzliches Risiko

H.-C. Diener, Essen

30 Sucht

Alkoholabhängige in psychosozialer Behandlung: Bewahrt Opiat-Antagonist vor Rückfall?

R. Brueck, H. Gann, Freiburg i. Br.

32 Suizidalität

Patientensuizid auf Station: Selbsttötung trotz fürsorglicher „Absprache“

M. Wolfersdorf, Bayreuth

33 Verhaltensstörungen

Rückwirkendes Erkennen einer ADHS im Erwachsenenalter – Was taugt das klinische Interview?

D. Ebert, Freiburg i. Br.

Bellage

Medizin Forum: Botulinumtoxin Typ B – eine potente Therapieoption

Titelbild: Corbis