

Politik und Perspektiven

Neuer West-Ost-Transfer

Die Gesundheitsreform verteilt um. 17

Schock-Diagnose per Anrufbeantworter

Wie Frauen mit Brustkrebs den Medizinbetrieb erleben. 19

Praxisführung und Geld

Damoklesschwert Gemeindesteuer

Für wen wird's teurer? 25

Anspruch auf Abfindung?

Schneller Rat vom Online-Experten-Express. 27

Impressum 28

Mit dem Passwort doc finden Sie in www.medical-tribune.de spezielle Informationen für Ärzte.


Placebokontrollierte Studien¹⁾²⁾ belegen die klinisch relevante Überlegenheit

- in der Kognition
- in den Alltagsfunktionen
- im klinischen Gesamturteil

und Axura® reduziert nachgewiesen den Placeaufwand³⁾.



- 1) Reisberg B. et al., New England Journal of Medicine 2003; 348: 1333-41
- 2) Winblad B. and Parisi N., Int. J. Geriatr. Psychiatry 1999; 14: 135-146
- 3) Wimo A. et al., Pharmacoeconomics 2003; 21 (5): 327-40

AXURA® Filmtabletten bzw. Tropfen. Wirkstoff: Memantinhydrochlorid. **Zusammensetzung:** Azn. wirts. Bestandteil: Eine Filmtbl. od. 1g Tropfen enth. 10 mg Memantinhydrochlorid (entspr. 8,31 mg Memantin). Sonst. Bestandteile: Filmtbl.: Lactose-Monohydrat, mikrokristalline Cellulose, hochdisperses Siliciumdioxid, Talkum, Magnesiumstearat, Methacrylsäure-Ethylacrylat-Copolymer (1:1), Natriumdodecylsulfat, Polysorbit 80, Triacetin, Simethicon-Ernkulsion. Tropfen: Kaliumsorbat, Sorbitol, destill. Wasser. **Anwendungsgebiete:** Zur Behandl. v. mittelschwerer bis schwerer Alzheimer-Krankheit. **Gegenanzeigen:** Kontraind. bei Überempf. gegenüber Memantin od. einem der sonst. Bestandteile. **Besond. Warnhinweise:** Die Anwend. ist nicht empf. bei schwerer Nierenfkt.stör., Epilepsie sowie bei Kindern und Jugendl. unter 18 Jahren. Die gleichz. Anwend. zusam. mit NMDA-Antagonisten wie Amantadin, Ketamin od. Dextrorhamphoran sollte vermieden werden. Eine bas. sorgfält. Überwachung ist erforderlich bei Anstieg d. pH-Wertes im Urin, z.B. durch Ernähr.unstell. (z.B. veget. Kost), massive Einnahme von Antazida, bei bekannter ren. tubul. Azidose (RTA) od. bei schwerer Infektion d. Harntrakts. Darüber hinaus engmaschige Überwach. bei kürzlic. zurücklieg. Myokardinf., dekomp. Herzinsuff. od. unkontroll. Blutdruck. **Schwangersch.:** Es liegen keine klin. Daten über d. Anwend. von Memantin während d. Schwangersch. vor, daher ist das potenz. Risiko für d. Menschen unbekannt. Memantin darf nicht während d. Schwangersch. angewendet werden, es sei denn, dies ist eindeutig erforderlich. **Säugl.:** Da nicht bekannt ist, ob Memantin in d. Muttermilch übergeht, sollen Frauen nach Memantingabe nicht stillen. **Nebenwirkungen:** In klin. Stud. im Anwend.gebiet unterschiedlich die Ges.häufigkeit der Nebenwirk. nicht von der unter Behandl. mit Placebo. Nebenwirk. waren gewöhnlich schwach bis mittelschwer ausgeprägt. Häufige Nebenwirk. (1-10% u. häufiger als bei Placebo) bei Pat. unter Memantin- bzw. Placebo-Behandl. waren: Halbzind. (2,0 vgl. mit 0,7%), Verwirr. (1,3 vgl. mit 0,3%), Schwindel (1,7 vgl. mit 1,0%), Kopfschmerzen (1,7 vgl. mit 1,4%) u. Müdigk. (1,0 vgl. mit 0,3%). Als gelegentl. Nebenwirk. (0,1-1% u. häufiger als bei Placebo) traten Angstzustände, Hypertonus (erhöht. Muskeltonus), Erbrechen, Blasenentz. u. gestrig. Libido auf. **Verschreibungspflichtig:** verschreibungspflichtig. **Stand:** Nov. 2002. Merz Pharmaceuticals GmbH, Eckenheimer Landstraße 100, D-60318 Frankfurt/Main, Deutschland. 

Von der KV im Stich gelassen Leichenschau-Honorar ist ein Hohn

Zum Leserbrief „Ziffer 100 viel zu mickrig – Leichenschau endlich richtig vergüten“, MT 28/03, S. 35

An MEDICAL TRIBUNE
Dem Brief des Kollegen Dr. Wild ist voll zuzustimmen. Die Honorierung der Leichenschau, wie sie sich unsere Selbstverwaltung vorstellt,

stellt eine Verhöhnung ärztlicher Arbeit dar. Anstatt für uns zu kämpfen, mutet man uns Ärzten zu, gegen die Spitzfindigkeiten der Gebührenordnungsjuristen gleichfalls spitzfindige Gegenargumente zu finden.

Dr. Helmut Kees
Facharzt für Allgemeinmedizin
Tübingen

Rauch Bein kne

AN ME
Fast jed
medizinis

Gefahren
Ärzten ist
der „Killer
anderen
Krankheit

wir wissen
ideale Par
für die En
In der
sicheren
kaum ein
der Offen
versitären
bildner ab
die Ärztev
kammern
nicht die
nere Bed
entwöhne

Sie sin
bei der S
blem „R
innere Ei
hen Stel
wöhnung
tierte Me
sein sollt
rend, da