

**2047 Zu diesem Heft**

**Aktuelles – kurz berichtet**

- 2053 Prävalenz konventioneller Risikofaktoren bei KHK
- 2053 Therapie-Entscheidungen in der letzten Lebensphase sehr unterschiedlich
- 2054 Systemischer Lupus erythematodes und Rauchen
- 2054 Non-Hodgkin-Lymphom: Sofortige Chemotherapie oder Abwarten?
- 2055 Einsatz von GP-IIb/IIIa-Antagonisten beim nichttransmuralem Myokardinfarkt
- 2055 Stressinkontinenz bei Frauen: Elektrische Stimulation ist nicht effektiv
- 2056 Morbus Crohn – Tacrolimus unterdrückt die Fistelbildung
- 2056 Schlaganfälle – Risikofaktoren und Inzidenz in den verschiedenen Altersgruppen

**Referiert – kommentiert**

- 2057 Haben Statine auch einen antiarrhythmischen Effekt?  
*Kommentar:* Konsequente Statintherapie bei KHK-Patienten mit AICD

**Hinterfragt – nachgehakt**

- 2058 Aderhautmelanome: Protonenstrahlen retten Augenlicht

**Originalien**

- 2059 Effekte des ärztlichen Controllings auf die DRG-gerechte Diagnosenverschlüsselung  
*C.-M. Reng, S. Blaas, N. Bregenzer, A. Hammond, K. Schlottmann*

**Original articles**

- 2059 Effects of contemporaneous control DRG-relevant coding by physicians

**Kasuistiken**

- 2065 Kutane amerikanische Leishmaniose. Besonderheiten der Diagnostik  
*G. Bormann, T. William, A. Schulz, W. Marsch, G. Gaber*

**Case reports**

- 2065 American cutaneous leishmaniasis. Special features in diagnosis and therapy

- 2069 Mediquiz



Oft entscheiden Patient, Angehörige und Arzt gemeinsam über die Therapie in der letzten Lebensphase.



Ulkus am rechten Unterschenkel.