

2455 Zu diesem Heft

Aktuelles – kurz berichtet

- 2461 Durch Rauchen sterben jährlich 5 Millionen Menschen
- 2461 Schlaganfallrisiko: Nahrungsfette spielen bei kardiovaskulär gesunden Männern keine Rolle
- 2462 Morbus Hodgkin: Später Erstkontakt mit Epstein-Barr-Virus soll Risiko erhöhen
- 2462 Senkt glutenfreie Babykost das Risiko für Typ-1-Diabetes?
- 2463 Hepatitis C: Interferon verbessert die Langzeitprognose
- 2463 Sind Stürze bei älteren Frauen abhängig von chronischen Erkrankungen und Medikation?
- 2464 Niedrigeres Geburtsgewicht ist später mit höherem Blutdruck assoziiert
- 2464 Zystische Fibrose: Helfen topische Aminoglykosid-Antibiotika?

Referiert – kommentiert

- 2465 Späte Malaria-Erkrankung trotz Chemoprophylaxe
Kommentar: Im Grunde nichts Neues...

Hinterfragt – nachgehakt

- 2466 Sind medikamentenbeschichtete Stents zu teuer?

Editorial

- 2467 Hypertonie 2003:
Abschied vom alten Liga-Schema
R. Düsing, M. Böhm

Aus Fachgremien & Konsensuskonferenzen

- 2468 Neue Empfehlungen der Deutschen Hochdruckliga zur medikamentösen Therapie der Hypertonie
W. Zidek, R. Düsing, H. Haller, M. Middeke, M. Paul, R. Schmieder, J. Schrader

Originalien

- 2470 Wirkung von Angiotensin II auf Entzündungsmediatoren bei gesunden Probanden
K. Lottemoser, G. Ulrich-Merzenich, H. Vetter, R. Düsing

Kasuistiken

- 2476 Hypertensive Koronaropathie
K. Walenta, M. Böhm
- 2479 Maligne Hypertonie bei Einzelniere mit doppelter Gefäßversorgung
B.-C. Werlemann, K.-F. Gürtler, R. Kolloch

Editorial

- 2467 Hypertension 2003: Goodbye to the old „League scheme“

From Expert Committees and Consensus Conferences

- 2468 New recommendations of the German Society of Hypertension for the drug treatment of hypertension

Original articles


- 2470 Effects of angiotensin II on inflammation mediators in healthy subjects

Case reports

- 2476 Hypertensive heart disease with coronary microangiopathy
- 2479 Malignant hypertension in a case of single kidney with two renal arteries



Fettarme Kost: Schützt sie vor einer koronaren Herzkrankheit, aber nicht vor einem Schlaganfall? (Bild: PhotoDisc).



Antihypertensive Kombinations-therapie mit den Medikamenten der ersten Wahl.