

Neurologie

Läsionen der weißen Substanz – ein Risiko?	<i>Lancet</i>	30
Kombitherapie bei Fazialisparese	<i>Ann Otol Rhinol Laryngol</i>	30
Merkstörungen – es war eine Epilepsie	<i>Funct Neural</i>	30

Onkologie

Hereditäres kolorektales Karzinom:		
Das individuelle Karzinomrisiko bestimmen	<i>J Lab Med</i>	32
Der Chemotherapie-induzierten Neutropenie gegensteuern	<i>Symp.</i>	32
Bösartige Neubildungen der Haut nach Organtransplantation sind häufig	<i>N Engl J Med</i>	32
Fortschritte beim Bronchialkarzinom	<i>Symp.</i>	33

Pädiatrie

Bei Gelenkschwellung an Hämophilie denken!	<i>BMJ</i>	34
Autismus durch zu viel Hirn?	<i>JAMA</i>	34

Phytomedizin

Phytopharmaka in der Dermatologie	<i>Arch Dermatol</i>	35
Kurkuma hemmt Entzündungen	<i>J Altern Complement Med</i>	35
Ingwer lindert PONV-Symptome nicht	<i>Anesth Analg</i>	35

Psychische Erkrankungen

Superselektiver SSRI eingeführt:		
Neuer Goldstandard für Antidepressiva?	<i>Symp.</i>	36
Therapie bei generalisierter Angststörung:		
Symptome reduzieren, Lebensqualität steigern	<i>BMJ</i>	36

Sportmedizin

Interdisziplinäre Therapie von Stressfrakturen	<i>Sportortho Sporttrauma</i>	37
Kniebandverletzung: größeres Risiko für Sportlerinnen	<i>J Bone Joint Surg Am</i>	37
Gehirnerschütterungen im Schulsport	<i>Neurosurgery</i>	37
Langsamer Aufstieg beugt Höhenkrankheit vor	<i>Lancet</i>	37
MED-INFO		38
Impressum		34

Was bedeuten die Symbole?

- | | |
|--------------------------------|--|
| A Anwendungsbeobachtung | M Metaanalyse |
| G Fall-Kontroll-Studie | R Randomisiert-kontrollierte Studie |
| F Fallbericht | S Sonstige Studienarten |
| K Kohortenstudie | U Übersicht |

Pflegekräfte melden Nebenwirkungen

In England wurde der Personenkreis zur Meldung von Arzneimittelnebenwirkungen auf das Pflegepersonal ausgeweitet.

Die Meldequote (ein Bericht pro sieben Pflegekräften) entsprach etwa der parallel erfassten Meldequote bei Ärzten (ein Bericht pro acht Ärzte).

Arzneimittel-Nebenwirkungen Pflegepersonal

77% der 177 Berichte von Pflegekräften entsprach den Anforderungen der Gesundheitsbehörde; bei den Ärzten waren es 69%. Der Anteil der gemeldeten schwerwiegenden

Nebenwirkungen (29 von 58) lag bei Pflegekräften von Fachärzten signifikant höher als bei den übrigen Pflegekräften (50% vs. 29%).

FAZIT: Pflegekräfte können einen wertvollen Beitrag zur Verbesserung der Pharmakovigilanz leisten. (CE)

S Morrison-Griffiths S et al.: Reporting of adverse drug reactions by nurses. *Lancet* 361 (2003) 1347-1348

✖ Bestellnr. der Arbeit 032095

Seelisches Gleichgewicht am Ende

„Spiritual well-being“ meint den Glauben an eine übergeordnete Bedeutung im Leben und im Tod.

In einem US-amerikanischen Hospiz waren bei seelisch ausgeglichenen Patienten die Sehnsucht nach baldigem Tod ebenso wie Suizidgedanken seltener. Bei

Menschen mit geringer seelischer Gesundheit waren Depressionen viel häufiger.

Lebensende seelische Verfassung

FAZIT: In der Palliativversorgung von terminal Erkrankten sollte versucht werden, ein Gefühl des seelischen Friedens zu unterstützen. (Ko)

S McClain CS et al.: Effect of spiritual well-being on end-of-life despair in terminally-ill cancer patients. *Lancet* 361 (2003) 1603-1607

✖ Bestellnr. der Arbeit 032036

DAZUGELERNT

