

Review

Meixner, K., Glattacker, M., Engel, E.-M., Gerdes, N., Bengel, J. & Jäckel, W.H. Frauen in Mutter-Kind- und Mütter-Einrichtungen: Eingangsbelastungen, Therapieziele, Patientinnenzufriedenheit und Behandlungseffekte	319
Fuchs, T. Non-verbale Kommunikation: Phänomenologische, entwicklungspsychologische und therapeutische Aspekte	333
Hampel, P., Petermann, F., Stauber, T. & Fasthoff, C. Konzeption eines kognitiv-behavioralen Anti-Stress-Trainings (AST) für Erstklässler	346
Schowalter, M., Richard, M., Murken, S., Senst, R. & Rüdell, H. Die Integration von Religiosität in die psychotherapeutische Behandlung bei religiösen Patienten – ein Klinikvergleich	361
Albani, C., Schmutzer, G., Blaser, G., Körner, A., Geyer, M. & Brähler, E. Der „Unsicherheitsfragebogen“ – Anwendung in einer repräsentativen Bevölkerungsstichprobe und bei Psychotherapiepatienten	375
Buchbesprechungen	387
Kongreßankündigungen	393

Zeitschrift für Klinische Psychologie, Psychiatrie und Psychotherapie

51. Jahrgang 2003, Heft 4, Seiten 319-395.

Im Auftrag der Görres-Gesellschaft herausgegeben von B. Bogerts (Magdeburg), K. Heinrich (Düsseldorf), H. Lang (Würzburg), H. Lauter (München), F. Petermann (Bremen)

Wissenschaftlicher Beirat: U. Baumann (Salzburg), W. Blankenburg (Marburg/Lahn), L. Blöschl (Graz), G. Bodenmann (Freiburg/Schweiz), E. Brähler (Leipzig), R. Ferstl (Kiel), J. Glatzel (Mainz), M. Haupt (Düsseldorf), W. Huber (Louvain-LaNeuve), B. K. Kimura (Kyoto), A. Kraus (Heidelberg), P. Matussek (München), U. Moser (Zürich), P. Netter (Gießen), B. Paulikhoff (Münster), N. Scherbaum (Essen), H. Schipperges (Heidelberg), O.B. Scholz (Bonn), J. Stork (München), I. Strauch (Zürich), A. Vukovich (Regensburg), P. Warschburger (Bremen), W. Wittling (Eichstätt).

Schriftleiter: Prof. Dr. Franz Petermann (federführend), Klinische Psychologie der Universität Bremen, Grazer Straße 6, 28359 Bremen; Prof. Dr. med. K. Heinrich, Psychiatrische Klinik der Universität Düsseldorf, Bergische Landstraße 2, 40629 Düsseldorf.

Redaktionsmitarbeiter: Dr. Silvia Wiedebusch, Klinische Psychologie der Universität Bremen, Grazer Straße 6, 28359 Bremen

Verlag Ferdinand Schöningh, Postfach 2540, 33055 Paderborn, Telefon (0 52 51) 127-5

Erscheinungsweise vierteljährlich

Manuskripte und Besprechungsexemplare sind an den zuständigen Schriftleiter zu richten. Manuskripte jeweils mit einer kurzen Inhaltsangabe (summary) von 10 Zeilen. Unverlangte Manuskripte und Besprechungsexemplare werden nur zurückgesandt, wenn Porto beiliegt.

Printed in Germany. ISSN 1431-8172

© Verlag Ferdinand Schöningh Paderborn 2003

Die „Zeitschrift für Klinische Psychologie, Psychiatrie und Psychotherapie“ und alle in ihr enthaltenen einzelnen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Frauen in Mutter-Kind-Eingangsbelastungen und Patientinnenzufriedenheit

Meixner, Katja, Glattacker, Manuel, Jürgens, Jürgen

Mutter-Kind- und Mütter-Maßnahmen sind ein Bestandteil der rehabilitativen Versorgung von Frauen mit psychischen Symptomen. Ziel, die Behandlungsqualität in 62 Mutter-Kind-Einrichtungen zu dokumentieren. Die Datenerhebung im IRES-2, der den subjektiven Patientinnenzufriedenheit der Mutter-Kind- und Mütter-Einrichtungen angeht, wurde bei 62 Frauen im IRES-Summenscore auffällige oder gravierende Belastungen dokumentiert, die zum größten Teil durch die „Vitale Erschöpfung“ gewählt. Die Behandlerinnen und -therapeuten sowie auf der psychosozialen Ebene eine hohe Akzeptanz. Der IRES-2 Status“ bei Behandlungsende beträgt 0,92. Die IRES-2 handlungsende errechnet sich ein Wert von 0,92. Frauen, die an einer Mutter-Kind- oder Mütter-Einrichtung Eingangsbelastungen bestehen, die sich in der Behandlungseffekte zum Katamnesezeitpunkt nicht mehr in den Alltag gelungen ist.

Since 1989, provisions for mother-child care are an inherent part of inpatient rehabilitation for women with psychological symptoms due to biological and psychological factors. The main target group for treatment. The results on quality assurance of treatment effects were measured by means of the IRES-2-patient health questionnaire addressing the subjective and psychosocial dimensions. The IRES-2 was adapted to the specific aims of mother-child care. In addition, a patient satisfaction questionnaire was used. 78% of the treated women showed serious symptoms. Among the therapy goals, the „burn-out“ was a broad acceptance of the rehabilitation programmes offered in the centers. The IRES-2 score showed an effect size of 0.92 at discharge. Results point out, the severe strain and symptoms were significantly reduced over their treatment period. It will still be observed six months after treatment. The results of the therapeutic interventions into the everyday lives.