



Magenulzerationen sind eine gefährliche Nebenwirkung von nicht steroidalen Antiphlogistika – nicht aber bei den neuen COX-2 Hemmern.

Seite 10



Morbus Alzheimer: Möglichst früh erkennen.

Seite 22

Titelbild:
Gino de Cunzio.
«La dormiente», 1989
Bildausschnitt.
© MMV, 2003
4002 Basel

IN EIGENER SACHE

Unverzichtbarer Wandel	3
------------------------	---

JOURNAL

Kombitherapie bremst effektiv die Proteinurie	9
Verlangsamung der Knorpeldestruktion durch Chondroitinsulfat?	9
Celecoxib bei gleicher Wirkung sicherer als NSAR – auch mit Aspirin	10
Diuretika – Mehr als nur Symptomkontrolle	12

AKTUELL

Das Restless Legs Syndrom: Es kostet nicht nur Schlaf	13
Die häufigste Krankheit des Magendarmtrakts: Reflux	17
So früh wie möglich: Diagnostik und Therapie der Alzheimer-Demenz	22

SONDERBERICHTE

Pharmakotherapie bei geriatrischen Patienten	24
Bei Patienten mit Osteoporose ist schnelle Therapie angesagt	28
Effekt auf Mikroarchitektur erklärt schnelle Wirkung	29
Donepezil auch bei vaskulärer Demenz	lose Beilage