

63 Zu diesem Heft

Aktuelles – kurz berichtet

- 67 Alte Patienten profitieren auch von einer Bypass-Operation
- 67 Letrozol im Anschluss an Tamoxifen vermindert Brustkrebsrezidive
- 68 Intensivpatienten neigen zu Herpesrezidiven
- 68 Rektumkarzinom – gute Prognose trotz später Metastase
- 69 Prognose bei Hepatitis C mittels nichtinvasivem Index
- 69 Multiple Sklerose: Welche Bedeutung haben Antikörper gegen β -Interferon?
- 70 Katheterablation: Kein Unterschied zwischen Männern und Frauen
- 70 KHK: Vergleich zwischen beschichteten und konventionellen Stents

Referiert – kommentiert

- 71 WPW-Syndrom: Ist die prophylaktische Ablation sinnvoll?
Kommentar: Prophylaktische Katheterablation bei asymptomatischen WPW-Patienten – nicht unumstritten

Hinterfragt – nachgehakt

- 72 Arthrose: eine Volkskrankheit im Abseits

Originalien

- 73 Patientenklassifikation und Risikoprofilanalysen bei Typ-2-Diabetikern in der Schwerpunktpraxis.
Ergebnisse der TEMPO-Studie®
B. Lippmann-Grob, R. A. Bierwirth, P. Kron, B. Leinhos, K. Funke, M. Huptas, M. Grüneberg, K. W. Weich, C. Münscher, F. Potthoff
- 82 Prospektive Studie zum Vergleich von herkömmlicher und transnasaler Ösophago-Gastro-Duodenoskopie in der Routinediagnostik
B. Krakamp, M. Parusel, T. Saers

Original articles

- 73 Patient classification and analysis of risk profiles at type 2 diabetics: results of the TEMPO study®
- 82 Prospective study comparing conventional and transnasal esophagogastroscopy during routine examination



Karzinom des rektosigmoidalen Übergangs.