

100% Qualität
100% Patientenakzeptanz
100% Wirtschaftlichkeit

Darauf können Sie sich verlassen:
Simvastatin-ratiopharm®

ratiopharm
Gute Preise. Gute Besserung.

PRAXISAKTUELL

RR-Selbstcheck spart Pillen

Wenn Hypertoniker selbst zur Blutdruckmanschette greifen, müssen sie weniger Antihypertensiva einnehmen. So das Ergebnis einer aktuellen Studie → 2

PRAXISMEDIZIN

Was Frauenherzen bricht

Kardiale Risikofaktoren wirken sich bei Frauen und Männern unterschiedlich aus. Was neben Diabetes und Zigaretten zu Evas gefährlichsten Herzensbrechern zählt → 10

PRAXISWIRTSCHAFT

Catcher im Notdienst

Einer Ihrer Patienten will aus dem Fenster springen. Nur durch Ihren massiven körperlichen Einsatz ist er noch zu retten. Müssen Sie unter Gewaltanwendung eingreifen? → 16

ÄRZTLICHE PRA

Freitag, 12. März 2004 • 56. Jahrgang, Nr. 21

Hausärztliche Op.-Vorbereitung künftig k

Wenn in Zukunft mehr ambulant operiert wird, intensivierte Zusammenarbeit zwischen Haus- und Fachärzten. Der neue EB... klar zu teilen. Lesen Sie in Teil 9 unserer Serie zum EB... präoperativen Untersuchung mit den Punkten jonglieren

Erste Hilfe in der Asthma-Not

Kinder reagieren auf sportliche Belastung häufiger mit bronchialer Spastik als Erwachsene. Vielfach beschränken sich die Beschwerden auf trockenen Husten und allgemeine Leistungsminderung, um nach spätestens 20 Minuten spontan abzuklingen. Bei schweren Asthma-Anfällen ist ärztliche Hilfe vonnöten. Dass Sauerstoff-Gabe Atemstillstand auslösen könnte, hat sich als Irrglaube erwiesen. Es ist durchaus sinnvoll, reichlich Sauerstoff zu geben. Weitere Regeln → 7

me / Foto: DAK/Wigger

