

533 Zu diesem Heft

Aktuelles – kurz berichtet

- 539 Akute Dyspnoe: schnelle Differenzialdiagnose mit B-Typ des natriuretischen Peptids
- 539 Behandlung des akuten Myokardinfarktes: Stenting mit oder ohne Abciximab?
- 540 COLIA 1-Polymorphismus möglicher Risikofaktor für Bandscheibendegeneration
- 540 Gestörte Glukosetoleranz in der Schwangerschaft mit höherer Inzidenz von Neoplasmen assoziiert
- 541 Guillain-Barré-Syndrom: Zusätzliche Steroide alleiniger Immunglobulingabe nicht überlegen
- 541 Alkoholhepatitis: Serumbilirubin als prognostischer Marker bei Kortikoid-Therapie
- 542 Früherkennung von Osteoporose mit Ultraschall
- 542 Wie groß sollte der Sicherheitsabstand bei der Primärexzision maligner Melanome sein?

Referiert – kommentiert

- 543 Akuter Myokardinfarkt: Was tun bei Kontraindikationen für eine Lyse?
Kommentar: Akute koronare Intervention Therapie der Wahl bei Lysekontraindikation

Hinterfragt – nachgehakt

- 544 Peritonealdialyse: zu wenig genutzt?

Originalien

- 547 Strukturkonzept zur Etablierung einer flächendeckenden ambulanten Versorgung von Patienten mit Typ-2-Diabetes. Ein-Jahres-Evaluation eines regionalen Schulungsvereins
M. Meier, B. Oepen, W. Horn, U. Steinhoff, M. Schütt

- 552 Evaluation eines fallbasierten computer-gestützten Lernsystems (CASUS) im klinischen Studienabschnitt
A. B. Simonsohn, M. R. Fischer

Kasuistiken

- 557 Idiopathische Hypereosinophilie mit kardialer Beteiligung
N. Martin, R. Ott, H. G. Klues

- 561 Mediquiz

Original articles

- 547 Structured concept for the establishment of a broad and ambulatory care of patients with type 2 diabetes: one-year evaluation of a regional teaching organization

- 552 Evaluation of a case-based computerized learning program (CASUS) for medical students during their clinical years

Case reports

- 557 Idiopathic hypereosinophilia with cardiac involvement



Die zusätzliche Gabe von Gp-IIb/IIIa-Antagonisten beim Herzinfarkt ist nützlich.



Kernspintomographie: Vierkammer- und Zweikammerblick.