

Spannungskopfschmerz oder Migräne, nur eine fiebrige Erkältung mit Kopfweh oder ein Tumor? Prof. Dr. Andreas Merkenschlager aus Leipzig erläutert verschiedene Aspekte kindlicher Kopfschmerzen

ab Seite **30**

**Kopfschmerzen**

Jeder zwanzigste akute Schmerz ist lebensgefährlich .....30

**Hirntumor**

Zu Anfang häufig als Migräne verkannt .....35

**Gelenkrheuma**

Jedes Jahr erkranken tausend Kinder .....36

**Off-Label-Use**

Wann Sie trotz Warnhinweis ein Schmerzmittel verordnen dürfen .....39

**Hallux valgus**


Passende Kinderschuhe verhindern Schmerzen durch Schiefzehe .....41

**Institut für Kinderschmerztherapie**

Bauchtänzer und Dickköpfe vertreiben den Schmerz .....42

**ÄP-Service**

Fachbücher, Patienten-Ratgeber und Internet-Adressen .....45



Täglich aktuelle Meldungen aus dem Fachbereich Pädiatrie finden Sie auf unserer Homepage [www.aerztlichepraxis.de](http://www.aerztlichepraxis.de)

Fotos: Bilderbox, Stockchange, KES/Reinbacher, Superbild; Titelbild: Bilderbox

**Vor** dem Pflaster ...

**Octenisept®  
Wund-  
desinfektion**



Ohne Altersbeschränkung bei Kindern

++ schmerzfrei ++

++ farblos ++

++ aus der Apotheke ++

[www.octenisept.de](http://www.octenisept.de)



Schülke & Mayr

**Octenisept® Wunddesinfektion** = Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Octandiolhydrochlorid 0,1 g, Phenoxethanol 2,0 g, Sonstige Bestandteile: (3-Cocodifatsäureamido-propyl)dimethylammoniumacetat, Natrium-D-gluconat, Glycerol 85%, Natriumchlorid, Natriumhydroxid, gereinigtes Wasser = Anwendungsgebiete: Zur wiederholten, zeitlich begrenzt unterstützenden antiseptischen Wundbehandlung = Gegenanzeigen: Bei Überempfindlichkeit gegen einen der Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile des Arzneimittels. Octenisept® Wunddesinfektion sollte nicht zu Spülungen in der Bauchhöhle (z.B. intraoperativ) und der Harnblase und nicht am Trommelfell angewendet werden = Nebenwirkungen: Als subjektive Symptom kann in seltenen Fällen ein vorübergehendes Brennen auftreten. = Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung: Octenisept® Wunddesinfektion nicht in größeren Mengen verschlucken oder in größeren Mengen in den Blutkreislauf, z.B. durch versehentliche Injektion, gelangen lassen. Bei Säuglingen sollte Octenisept® Wunddesinfektion nur unter ärztlicher Aufsicht angewendet werden. Pharmazeutischer Unternehmer: Schülke & Mayr GmbH, 22840 Norderstedt

Zum Kennenlernen einfach 50-ml-Muster anfordern!

- Nur eine Anforderung pro Jahr möglich -

Schülke & Mayr GmbH • 22840 Norderstedt  
Telefon 040-521 00 666 • [www.schuelke-mayr.com](http://www.schuelke-mayr.com)

Praxisstempel

APP-C-1/04

**COUPON**

Unterschrift