



Lentos Kunstmuseum Linz – erbaut von den Züricher Architekten Jürg Weber und Josef Hofer, eröffnet im Mai 2003.

© Dietmar Tollerian, Linz

2. JAHRESTAGUNG
DER ÖSTERREICHISCHEN GESELLSCHAFT FÜR NEUROLOGIE
MIT FORTBILDUNGS-AKADEMIE

18. bis 20. März 2004, Design Center Linz

BEITRÄGE

Neuropathischer Schmerz	8
R. BARON KIEL	
Multiple Sklerose	9
U. BAUMHACKL ST. PÖLTEN	
Medikamenten-induzierter Kopfschmerz	10
C. LAMPL, S. BONELLI LINZ	
Therapie der Alzheimer-Krankheit	11
G. RANSMAYR LINZ	
Vaskuläres Risikomanagement nach TIA und Schlaganfall	12
S. KIECHL INNSBRUCK	
Update in der Neuroonkologie	13
F. PAYER GRAZ	
Carpal-Tunnel-Syndrom, Sulcus-ulnaris-Syndrom	14
B. MAMOLI WIEN	
Multiple Sklerose	15
S. STRASSER-FUCHS GRAZ	
Autonome Neuropathie	16
H. LAHRMANN, W. STRUHAL WIEN	
Die neurogene Blasenfunktionsstörung	18
G. KISS INNSBRUCK	
Kognitive Neurologie	19
T. BENKE INNSBRUCK	
Morbus Parkinson	20
W. POEWE INNSBRUCK	
EDITORIAL	3
GRUSSWORTE DER ÖSTERREICHISCHEN GESELLSCHAFT FÜR NEUROLOGIE	4
PHARMANEWS	21

Kurzfachinformationen:

Seroquel 25 mg – Filmtabletten; Seroquel 100 mg – Filmtabletten; Seroquel 200 mg – Filmtabletten; Seroquel 300 mg – Filmtabletten; Seroquel 4-Tage Startpackung. Pharmakotherapeutische Gruppe: Antipsychotika; Zusammensetzung (arzneilich wirksame Bestandteile nach Art und Menge); Seroquel 25 mg – Filmtabletten: Eine Filmtablette enthält 25 mg Quetiapin als Quetiapinfumarat. Seroquel 100 mg – Filmtabletten: Eine Filmtablette enthält 100 mg Quetiapin als Quetiapinfumarat. Seroquel 200 mg – Filmtabletten: Eine Filmtablette enthält 200 mg Quetiapin als Quetiapinfumarat. Seroquel 300 mg – Filmtabletten: Eine Filmtablette enthält 300 mg Quetiapin als Quetiapinfumarat. Die Seroquel 4-Tage Startpackung enthält 6 Seroquel 25 mg – Filmtabletten, 3 Seroquel 100 mg – Filmtabletten und 1 Seroquel 200 mg – Filmtablette. Anwendungsgebiete: Behandlung der Schizophrenie. Behandlung der mittelgradigen bis schweren manischen Episode. Es wurde nicht nachgewiesen, daß Seroquel das Wiederauftreten von manischen oder depressiven Episoden verhindert (siehe Fachinformation Abschnitt 5.1). Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem Hilfsstoff des Präparates. Die gleichzeitige Gabe von Cytochrom P450 3A4 - Inhibitoren wie HIV-Proteasehemmern, antifungalen Wirkstoffen vom Azoltyp, Erythromycin, Clarithromycin und Nelazodon ist kontraindiziert (siehe auch Fachinformation Abschnitt 4.5 Wechselwirkungen mit anderen Mitteln). Hilfsstoffe: Kern: Povidon; Kalziumhydrogenphosphat Dihydrat; Mikrokristalline Zellulose; Natriumstärkeglykolat Typ A; Laktosemonohydrat; Magnesiumstearat. Überzug: Hypromellose; Macrogol 400; Titandioxid (E171); Eisenoxid gelb (E172) (Seroquel 25 mg und 100 mg – Filmtabletten); Eisenoxid rot (E172) (Seroquel 25 mg – Filmtabletten). Name oder Firma und Anschrift des Pharmazeutischen Unternehmers: AstraZeneca Österreich GmbH, Schwarzenbergplatz 7, A-1037 Wien. Verschreibungspflicht/Apothekenpflicht. NR, apothekenpflichtig. Informationen zu Nebenwirkungen, Wechselwirkungen mit anderen Mitteln und Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung sind der veröffentlichten Fachinformation (Austria Codex) zu entnehmen.

Ebixa® 10 mg Filmtabletten bzw. 10 mg/g Tropfen zum Einnehmen, Lösung. Zusammensetzung Filmtabletten: Eine Filmtablette enthält 10 mg Memantinhydrochlorid (entspricht 8,31 mg Memantin). Hilfsstoffe: Tablettenkern: Lactose-Monohydrat, mikrokristalline Cellulose, hochdisperses Siliciumdioxid, Talkum, Magnesiumstearat. Tablettenfilm: Methacrylsäure-Ethylacrylat-Copolymer (1:1), Natriumdodecylsulfat, Polysorbat 80, Talkum, Triacetin, Simethicon-Emulsion. **Zusammensetzung Lösung:** 1 g Lösung enthält 10 mg Memantinhydrochlorid (entspricht 8,31 mg Memantin). Hilfsstoffe: Kaliumsorbat, Sorbitol, destilliertes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Behandlung von Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Alzheimer-Krankheit. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegenüber dem arzneilich wirksamen Bestandteil oder einem der sonstigen Bestandteile. **Pharmazeutischer Unternehmer:** H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, DK-2500 Valby, Dänemark. **Abgabe:** Rezept- und apothekenpflichtig. **Weitere Angaben zu Nebenwirkungen, Wechselwirkungen mit anderen Mitteln, Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Gewöhnungseffekten** sind der veröffentlichten Fachinformation zu entnehmen. ATC-Code: N06DX01.