

### 339 Referiert und kommentiert

- 339 Therapie der BPH mit Finasterid und Doxazosin: Langzeitbeobachtung spricht für Kombination
- 344 Prostatabiopsie: Weniger Schmerzen durch Diclofenac
- 350 Anomalien des Urogenitaltrakts und therapeutische Konsequenzen: Kinder mit Einzelniere auf VUR und Harnleiterstenose screenen
- 356 ESWT bei der Peyronie-Krankheit: Keine überzeugenden Ergebnisse
- 357 Risikofaktoren für Nierenkarzinom bei älteren Frauen
- 359 Prostatakarzinome: Höherer COX2-Gehalt bei fortgeschrittenen Tumoren
- 361 Hohes Latexallergierisiko bei Kindern mit urologischen Fehlbildungen
- 363 Leitlinien der US-Fachgesellschaften bei Nierensteinen: Ureterskopie und ESWL als gleichwertig empfohlen
- 365 Neuer Marker für Prostatakrebs wird evaluiert
- 367 Testikuläre Mikrolithiasis und Hodenkarzinome: Bilaterale Kalzifikationen gehen mit erhöhtem CIS-Risiko einher
  
- 371 **Diskussionsforum Urologie**  
*Pro und Contra: Adjuvante Therapie beim lokoregionär fortgeschrittenen Prostatakarzinom nach radikaler Prostatektomie*
- 375 **Tipps und Tricks**
- 377 **Klassische Arbeiten**
- 379 **Online aktuell**
- 381 **Recht in der Praxis**
- 387 **Fragen für den Facharzt**
- 389 **Qualitätsmanagement**
- 391 **Kongresskalender**



EPCA – ein neuer Tumormarker für das Prostatakarzinom. Kann er die Früherkennung künftig erleichtern? Seite 365