

PRAXIS-Journal Club

- 1564 K. Eichler
Orale Antikoagulation bei Vorhofflimmern auch im klinischen Alltag effektiv
- 1566 M. Scharplatz
Höhere Statindosis effektiver als Standarddosierung nach akutem koronarem Ereignis?
- 1568 M. Puhan
Depressive Symptomatik sollte bei Patienten mit koronarer Herzkrankheit erfasst werden

Rubriken

- 1569 Impressum
1578 Vorschau

Magazin

- 1572 **Aktuelles:** Komplementärmedizin, Neue Medien: Praxis-Netwatch
1575 **Kulturelles:** Mediziner-Literatürrätsel, Musiktheater, Ausstellungen

Andreafol®**schützt vor NRD****BAG und DACH empfehlen ...**

allen Frauen, die schwanger werden möchten oder könnten
zusätzlich zu folsäurereicher Nahrung
die kontinuierliche Einnahme
von 0,4 mg Folsäure pro Tag in galenischer Form¹⁾
nichts mehr, nichts weniger und nichts anderes

1) Bulletin des Bundesamts für Gesundheitswesen 8/2001 und 6/2003; DACH Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr 2000
Z: Folsäure 0,4 mg; I: Vorbeugung von Neuralrohrdefekten; D: 1 T tägl.; KI: Überempfindlichkeit gegen Inhaltsstoff; UAW: selten allergische Reaktionen oder leichte gastrointestinale Störungen; IA: v.a. Folsäureantagonisten, Antiepileptika; P: 30 und 90 T; Verkaufskategorie C. Andreabal AG, 4054 Basel. Mehr im Kompendium