

Nr. 3/2004, 8. Jahrgang

K. Silberbauer Editorial	5
T. Marte, H. Drexel Lipidsenker bei Hypertonie – Was besagt die Evidenz?	7
Y. Dörffel, W. V. Dörffel, J. Scholze Differentialtherapie mit Kalziumantagonisten	11
M. Böhm, M. Burkart, G. Baumann Sildenafil wird auch von Patienten mit einer erektilen Dysfunktion und einer Mehrfachmedikation bei bestehender arterieller Hypertonie gut toleriert	17
H. Koller Fallbericht: Renovaskuläre Hypertonie bei Systemischem Lupus erythemathodes und sekundärem Antiphospholipidsyndrom	20
Leserbrief	22
Mitteilungen der Österreichischen Gesellschaft für Hypertensiologie	23
Pharma-News	25
Hinweise für Autoren, Impressum	30

## Fachinformation zu S. 2

**Nomexor® 5 mg-Tabletten. Zusammensetzung** (arzneilich wirksame Bestandteile nach Art und Menge): Eine Tablette Nomexor enthält 5,45 mg Nebivololhydrochlorid (entspr. 5 mg Nebivolol). **Anwendungsgebiete:** Essentielle Hypertonie. **Gegenanzeigen:** · Überempfindlichkeit gegenüber dem arzneilich wirksamen Bestandteil oder einem der Hilfsstoffe · Leberinsuffizienz oder Leberfunktionsstörungen · Schwangerschaft und Stillzeit. Beta-Rezeptorenblocker sind kontraindiziert bei: · kardiogenem Schock · akuter Herzinsuffizienz · Sick sinus-Syndrom, einschließlich SA-Block · AV-Block 2. und 3. Grades · Bronchospasmen und Asthma bronchiale in der Anamnese · unbehandeltem Phäochromozytom · metabolischer Azidose · Bradykardie (Herzfrequenz unter 50/Minute) · Hypotonie · schweren peripheren Durchblutungsstörungen. **Verschreibungspflicht / Apothekenpflicht:** Rezept- und apothekenpflichtig. **Name oder Firma und Anschrift des pharmazeutischen Unternehmens:** A.Menarini Pharma G.m.b.H., Wien. Weitere Angaben zu Nebenwirkungen, Wechselwirkungen mit anderen Mitteln sowie Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung sind der veröffentlichten Fachinformation zu entnehmen.

## Fachinformation zu S. 6

**Olmotec® 10 mg/20 mg/40 mg-Filmtabletten. Zusammensetzung:** 1 Filmtablette enthält 10 mg, bzw. 20 mg, bzw. 40 mg Olmesartan medoxomil. **Anwendungsgebiete:** Behandlung essentieller Hypertonie. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der übrigen Bestandteile von Olmetec®-Tabletten, zweites und drittes Schwangerschaftstrimenon, Stillzeit, Gallenwegsobstruktion. Hilfsstoffe: Tablettenkern: Mikrokristalline Cellulose, Lactose-Monohydrat, Hydroxypropylcellulose, Magnesiumstearat. Film-Überzug: Titandioxid (E 171), Talkum, Hypromellose. **Name und Anschrift des pharmazeutischen Unternehmens:** Sankyo Pharmazeutika Austria GmbH, A-1160 Wien. **Verschreibungspflicht/Apothekenpflicht:** Rezept- und apothekenpflichtig. Wirkstoffgruppe: Angiotensin-II-Antagonisten. Die Informationen zu den Abschnitten Dosierung, Warnhinweise, Wechselwirkungen, Nebenwirkungen und Gewöhnungseffekte sind der veröffentlichten Fachinformation zu entnehmen.  
www.sankyo-pharma.at • www.olmetec.com