

Therapie

akzeptabler Nebenwirkung

Immunsuppressivum für die Behandlung der Uveitis

eser Zielset-
kunde seit
va wie Cy-
oder Aza-
esetzt, wo-
der einge-
rapiedauer,
oxische und
gen


wurden die Daten von 106 Patienten mit Uveitis (Uveitis anterior n=26, Uveitis intermedia n=51, Uveitis posterior n=23, Panuveitis n=6) analysiert, die zwischen 1998 und 2003 in der Universitäts-Augenklinik Tübingen mit CellCept behandelt wurden. Der Nachuntersuchungszeitraum be-

dungsrezidiv, sechs Patienten hatten zwei Rezidive und acht Patienten drei oder mehr Rezidive.

Über den Beobachtungszeitraum wurden die serologischen Parameter entweder durch uns oder den jeweiligen Hausarzt oder Internisten des Patienten überwacht. Insgesamt

wurde MMF erstaunlich gut vertragen: 42 von 106 Patienten gaben keine Nebenwirkungen an; die nebenstehende Abbildung zeigt alle erhobenen Nebenwirkungen ihrer Häufigkeit nach aufgetragen.

Insgesamt halten wir aufgrund der gefundenen



Inhalt

Special

**Augeninnendrucksenkung:
Benzodiazepin als Mittel
letzter Wahl** Seite 10

**Okuläre Hämodynamik:
Tonusbeeinflussung
durch Acetazolamid** Seite 11

Medizin

**Neues Patent:
Emotionale Reaktionen werden
an Pupille gemessen** Seite 12

