

Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde

- 862 Faktor-VIII-Aktivität bei Patienten mit Zentralvenenverschluss im Vergleich zu Patienten mit tiefer Becken- und Beinvenenthrombose und gesunder Kontrollgruppe

F. Faude, S. Faude, A. Siegemund, P. Wiedemann

Eine erhöhte Faktor-VIII-Aktivität gilt bei tiefen venösen Thrombosen als thrombophiler Risikofaktor. Neben dem bekannten Einfluss auf die tiefen Becken- und Beinvenenthrombosen muss ein Einfluss der thrombophilen Wirkung von Faktor VIII über 150% Aktivität auch auf die zentralvenösen retinalen Verschlüsse vermutet werden.

Kasuistiken

- 867 Defektverschluss mit Sklerainterponaten
S. Kompa, C. Redbrake, O. Arend, A. Remky

Bei 28 Augen von 27 Patienten wurden große korneosklerale und sklerale Defekte verschiedener Ursachen mittels homologem Sklerainterponat verschlossen. In 85,7% der Fälle (n=23) konnten die Defekte über einen Zeitraum von bis zu 73 Monaten verschlossen und damit der Bulbus erhalten werden. Indikationen, postoperative Komplikationen und Fallbeispiele werden diskutiert.

- 872 Epibulbäre Dermoiden – Klinisches Bild und
Therapiemöglichkeiten
F. Sommer, L. E. Pillunat

Bei epibulbären Dermoiden handelt es sich um kongenitale Veränderungen mesodermaler und ektodermaler Herkunft mit vorwiegender Lokalisation am Limbus corneae im temporal unteren Quadranten. Retrospektiv wird über 6 Patienten berichtet, die im Alter von 9 Monaten bis 6 Jahren mit der Frage nach Therapiemöglichkeiten bei limbärem Dermoid in der Universitäts-Augenklinik Dresden vorgestellt wurden, wobei bei zweien die alleinige Dermoidabtragung erfolgte, bei drei Patienten war zusätzlich eine Keratoplastik erforderlich (zweimal lamellierend, einmal perforierend); in dem Fall eines 2-jährigen Mädchens erfolgte bisher noch keine Operation, sondern lediglich die Amblyopieprophylaxe. Die postoperativen Ergebnisse reichten von unkompliziertem Verlauf bis zu Hornhauttransplantateinrührung mit erforderlicher Rekeratoplastik, können jedoch insgesamt als günstig angesehen werden.

- R71 Refresher: Akuter Strabismus

- 862 Factor VIII Activity in Patients with Central Retinal Vein Occlusion in Comparison to Patients with a History of Venous Thrombosis and a Healthy Control Group

F. Faude, S. Faude, A. Siegemund, P. Wiedemann

Case Reports

- 867 Management of Defects by Scleral Grafts
S. Kompa, C. Redbrake, O. Arend, A. Remky

- 872 Epibulbar Dermoids – Clinical Features and
Methods of Therapy
F. Sommer, L. E. Pillunat