

- 100 **Alkohol-Konsum und Demenz-Risiko** | Journal of the American Geriatrics Society 2004; 52: 540-544
- 100 **Auswirkung psychiatrischer und anderer nicht motorischer Symptome auf die funktionelle Beeinträchtigung bei Parkinson Erkrankung** | Journal of the American Geriatrics Society 2004; 52: 784-789
- 101 **Körperfunktionen, Depression und Behandlungswünsche am Ende des Lebens – die John Hopkins Vorläuferstudie** | Journal of the American Geriatrics Society 2004; 52: 577-581
- 101 **Überlebensraten bei älteren Patienten mit Glioblastoma multiforme nach Operation, Bestrahlung und Chemotherapie** | Surg Neurol 2004; 62 (3): 207-13; discussion 214-5
- 101 **Beziehung zwischen Herzinfarkten und der Einnahme von Schmerzmitteln (Coxiben) bei älteren Patienten** | Circulation 2004; 109: 2068-2073
- 102 **Fortgeschrittenes Parkinsonsyndrom: Direkte Umstellung von Dopaminagonisten auf Pramipexol erweist sich als sicher und effizient** | J Neurol 2004; 251: 335-339
- 102 **Der Effekt der Bewegungstherapie bei älteren Patienten mit Demenz** | Arch Phys Med Rehabil 2004; 85 (10): 1694-704

VERSORGUNG

- 103 **Selbstständigkeit erhalten – so lange wie möglich**
D. Fernholz
- 104 **Kann eine qualitätsgesicherte Heimbetreuung heute noch gewährleistet werden?**
D. Fernholz
- 105 **Memory-Kliniken – eine taugliche Antwort auf die Herausforderung Demenz?**
D. Fernholz

RUBRIKEN

- A 3 Editorial
- A 5 Impressum
- A 9 Herausgeber, Editorial Board
- 106 Pharma News
- 111 Neue Bücher
- 112 Termine
- 113 Autorenhinweise
- 114 Vorschau

Almidrid', Wirkstoff: α -Dihydroergocryptinmethansulfonat. Verschreibungspflichtig. **Zus.:** 1 Kapsel Almidrid'5 enth. 5mg α -Dihydroergocryptinmethansulfonat, 1 Tabl. Almidrid'20 enth. 20mg α -Dihydroergocryptinmethansulfonat. Sonst. Bestandteile: Almidrid'5: Mikrokristalline Cellulose, Eisenoxid (E172), Erythrosin (E127), Gelatine, Indigocarmin (E132), Lactose, Magnesiumstearat, Maisstärke, Natrium dodecylsulfat, Titandioxid (E71). Almidrid'20: Mikrokristalline Cellulose, Croscarmellose-Na, Lactose, Magnesiumstearat, Povidon. **Anw.gebiete:** Z. Behandlg. d. Schüttelähmung (id. opathischer Morbus Parkinson); b. Pat. ohne Fluktuationen i. Krankheitsbild als Monotherapie o. i. Komb. m. Levodopa (m. o. ohne Decarboxylasehemmer). **Gegenanz.:** Schwangerschaft u. Stillzeit, b. Überempfindl.chkt., gg. d. Wirkstoff, andere Mutterkornalkaloide, sonst Bestandteile d. Arzneim. sowie i. Kindesalter. Gleichz. Einnahme anderer Mutterkornalkaloide, Besondere Vorsicht b. Pat. m. Leberinsuffizienz, n. körperl. begründb. Psychosen sowie best. Hypotonie o. b. gleichz. Behandlg. m. Antihypertensiva. **Nebenw.:** Sehr häufig: Übelkt. u. Magenschmerzen, Häufig: Schwächegefühl, Kopfschmerzen, Schwindel, Erbrechen, Sodbrennen bzw. Magenkrämpfe, Hypotonie (Senkung um bis z. 5 mm Hg), orthostat. Kreislaufbeschw., Tachykardie, Unruhe, Ödeme, depress. Verstimmung, Schlaflosigkeit, Exantheme, Gewichtsveränderg. u. trock. Mund. Gelegentl.ch: Unwohlsein, Rast- bzw. Ruhelosigt., Angst, Gefühllosigkeit, Kribbeln u. Kältegefühl i. Armen u. Beinen, Gefühl d. verstopften Nase, Libidoverlust, Bewegungsstörungen, Verwirrheitszustände, Muskelkrämpfe, Hyperhidrosis, Zittern, Appetitlosigkeit, Agitiertheit, Tinnitus, Stenokardie, Obstipation, Apträume, Halluzinationen. D. Nebenw. treten überwiegend dosisabhängig auf. B. Langzeitbehandlg. m. Medikamenten, die sich i. inner. Struktur v. Mutterkornalkaloiden ableiten, wurden sehr selten Pleuraergüsse u. pleuropulmonale Fibrosen beobachtet. E. Zusammenhang zwischen α -Dihydroergocryptin u. e. derartigen Befund ist nicht gesichert. Pat. m. unklaren pleuropulmonalen Sympt. sollten sorgfältig überwacht werden. Verkehrs- u. Reakt.hinweise: Möglicherweise Nebenw. wie z.B. Kreislaufbeschwerden, Schwindel, Kopfschmerzen o. Verwirrheitszustände auf, wodurch d. Seh- u. Reakt.vermögen sowie d. Urteilskraft vermindert werden. Almidrid' kann deshalb a. b. bestimmungsgem. Gebrauch d. Reakt.vermögen soweit verändern, dass d. Fähigkeit z. akt. Teilnahme a. Straßenverkehr u. z. Bedienen v. Maschinen beeinträchtigt wird. D. gilt i. verstärktem Maße i. Zusammenwirken m. Alkohol o. and. zentr. wirkw. Medikamenten. **Wechselwirkungen, Dosierungsempfehlg. u. w. Hinweise:** Siehe Fach- u. Gebrauchsinfo. **Darreichungsformen u. Packungsgrößen:** Almidrid'5: Pckg. m. 30 Kapseln (N1), Almidrid'20: Pckg. m. 30 (N1), 60 (N2) u. 100 Tabl. (N3). Stand: Juli 2002.

DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH, Weg beim Jäger 214, 22335 Hamburg, www.desitin.de


 DESITIN