

Inhalt Contenu



Couverture

Corrosion: bracket trempé dans une solution de NaCl à 0,9 %

Fredy Schmidli

Institut des matériaux dentaires et technologie
Centre de médecine dentaire de l'Université de Bâle
(Directeur: Prof. Dr. J. Meyer)

Zum Titelbild

Korrosion: Bracket in 0,9% NaCl

Fredy Schmidli

Institut für Werkstoffwissenschaft und Technologie
Zentrum für Zahnmedizin der Universität Basel
(Leiter: Prof. Dr. J. Meyer)

- 1223 Editorial en français
1225 Editorial deutsch

Forschung · Wissenschaft

Recherche · Science

- 1228 **Laser und Ultraschall in der Therapie periimplantärer Infektionen – eine Literaturübersicht**
FRANK SCHWARZ, KATRIN BIELING, ANTON SCULEAN, MONIKA HERTEN und JÜRGEN BECKER
- 1236 **Das aktive Mundgesundheitsverhalten in Deutschland und in der Schweiz**
HANS JÖRG STAEHLE

Praxis · Fortbildung

Pratique quotidienne · formation complémentaire

- 1255 **Lippen-Kiefer-Gaumenspalt-Chirurgie in Indien**
J. THOMAS LAMBRECHT, TH. KREUSCH, G. VON LA ROSÉE
Arbeiten und Lehren in einer solchen Umgebung sind Teil der Erfahrungen ausgebildeter Chirurgen wohlhabender Länder geworden, nicht nur aus altruistischen Motiven heraus, sondern um ihrem eigenen Leben eine weitere Perspektive zu eröffnen.
- 1263 **Chirurgie de la fente labio-alvéolo-palatine en Inde**
J. THOMAS LAMBRECHT, TH. KREUSCH, G. VON LA ROSÉE
Le travail et la formation dans un tel environnement sont devenus une partie des expériences des chirurgiens qualifiés de pays développés, non seulement pour des motifs altruistes, mais aussi pour ouvrir une autre perspective à leur propre vie.

- 1271 **Komplikationen bei und nach operativer Weisheitszahnentfernung**

JEANNINE ARRIGONI und J. THOMAS LAMBRECHT
Die operative Entfernung der Weisheitszähne sollte aus prophylaktischen Gründen vor dem 25. Lebensjahr erfolgen, da die intra- und postoperativen Komplikationen danach signifikant ansteigen.

- 1280 **Complications durant et après avulsion chirurgicale de dents de sagesse**

JEANNINE ARRIGONI et J. THOMAS LAMBRECHT
Les auteurs préconisent l'avulsion chirurgicale des dents de sagesse à titre prophylactique avant l'âge de 25 ans, du fait que le taux des complications péri- et postopératoires augmente significativement par la suite.