

Zusammensetzung: Arzneilich wirksame Bestandteile: 1 Tablette enthält 10 mg/10 mg, 10 mg/20 mg, 10 mg/40 mg oder 10 mg/80 mg Ezetimib/Simvastatin. **Sonstige Bestandteile:** Butylhydroxyanisol (Ph. Eur.), Citronensäure-Monohydrat, Croscarmellose-Natrium, Hypromellose, Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat (Ph. Eur.), Mikrokristalline Cellulose, Propylgallat (Ph. Eur.). **Anwendungsgebiete:** Primäre Hypercholesterinämie: Begleitend zu Diät bei primärer Hypercholesterinämie oder gemischter Hyperlipidämie, wenn Therapie mit einem Kombinationspräparat geeignet, bei Patienten, bei denen eine Therapie mit einem Statin oder Ezetimib alleine nicht ausreicht oder die bereits mit einem Statin und Ezetimib behandelt werden. Simvastatin reduziert die Häufigkeit kardiovaskulärer Ereignisse. Studien dazu für INEGY® noch nicht abgeschlossen. **Homozygote familiäre Hypercholesterinämie:** Begleitend zu Diät angezeigt bei Patienten mit homozygoter familiärer Hypercholesterinämie, dazu weitere begleitende Therapien (wie LDL-Apherese) möglich. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegenüber den arzneilich wirksamen Bestandteilen oder einem der Hilfsstoffe. Schwangerschaft und Stillzeit. Aktive Lebererkrankung oder unklare und andauernde Erhöhung der Serum-Transaminasen. Gleichzeitige Anwendung von potenten CYP3A4-Inhibitoren (z. B. Itraconazol, Ketoconazol, Erythromycin, Clarithromycin, Telithromycin, HIV-Protease-Inhibitoren oder Nefazodon). **Kinder:** Behandlung wird nicht empfohlen. **Warnhinweise:** Enthält Lactose.

Nebenwirkungen: Unter INEGY® häufig ($\geq 1/100$, $< 1/10$) in klinischen Studien: Asthenie, Arthralgie, Myalgie, Schwindel, Kopfschmerzen. Unter Ezetimib häufig in klinischen Studien: Bauchschmerzen, Diarrhö, Müdigkeit, grippeartige Erkrankung; Muskelkrämpfe. Selten ($\geq 1/10000$, $< 1/1000$) nach Markteinführung: Überempfindlichkeitsreaktionen einschließlich Angioödem, Hautausschlag. Unter Simvastatin selten in klinischen Studien und/oder nach Markteinführung: Anämie; Bauchschmerzen, Obstipation, Diarrhö, Dyspepsie, Flatulenz, Übelkeit, Erbrechen, Pankreatitis, Hepatitis/Ikterus; Muskelkrämpfe, Myopathie, Rhabdomyolyse; Parästhesien, periphere Neuropathie; Alopezie, Pruritus, Hautausschlag. Selten ein offensichtliches Hypersensitivitätssyndrom, mit einem oder mehreren der folgenden Symptome: angioneurotisches Ödem, Lupus-ähnliches Syndrom, Polymyalgia rheumatica, Dermatomyositis, Vaskulitis, Thrombozytopenie, Eosinophilie, Beschleunigung der Blutsenkungsgeschwindigkeit, Arthritis/Arthralgie, Urtikaria, Photosensitivität, Fieber, Gesichtsrötung, Dyspnoe und allgemeines Krankheitsgefühl. Erhöhungen der Serum-Transaminasen (ALT und/oder AST \geq dem Dreifachen des oberen Normwertes in Folge) im Allgemeinen asymptomatisch, nicht im Zusammenhang mit Cholestase und reversibel mit einer Häufigkeit von 1,9% unter INEGY®. Erhöhungen der CK (\geq dem Zehnfachen des oberen Normwertes) mit einer Häufigkeit von 0,3% unter INEGY®. **Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:** Es wurde über Schwindel berichtet. **Wechselwirkungen:** Es sind keine weiteren Wechselwirkungen für die Kombination als die der Einzelsubstanzen bekannt. **Dosierung:** Primäre Hypercholesterinämie: 10 mg/10 mg pro Tag bis zu 10 mg/80 mg pro Tag am Abend je nach LDL-Cholesterinwerten, Risiko für die Entwicklung einer KHK und der bisherigen lipidsenkenden Therapie. Dosisanpassungen – falls erforderlich – in Abständen von 2–4 Wochen. Zur Dosierung bei homozygoter familiärer Hypercholesterinämie, älteren Patienten, pädiatrischen Patienten, bei Patienten mit Leberfunktionsstörungen oder Nierenfunktionsstörungen und bei gemeinsamer Gabe mit anderen Arzneimitteln siehe Fachinformation. **Verschreibungspflichtig.** **Packungsgrößen:** Blisterpackungen mit 30, 50 oder 100 Tabletten; KP. Stand: 04/2004

Weitere Einzelheiten enthalten die Fach- und die Gebrauchsinformation, deren aufmerksame Durchsicht wir empfehlen.

Pharmazeutischer Unternehmer:
MSD-SP Limited
Hertford Road, Hoddesdon, Hertfordshire EN11 9BU
Vereinigtes Königreich

Mitvertrieb:
MSD SHARP & DOHME GMBH, 85530 Haar
ESSEX PHARMA GMBH, 81737 München
MSD CHIBROPHARM GMBH, 85530 Haar
DIECKMANN ARZNEIMITTEL GMBH, 85530 Haar
CHIBRET PHARMAZEUTISCHE GMBH, 85530 Haar
VARIPHARM ARZNEIMITTEL GMBH, 85530 Haar

INEGY® ist eine eingetragene Marke von MSP Singapore Company, LLC

MSD Tel.: 0800/673 673 673
Infocenter Fax: 0800/673 673 329
e-mail: infocenter@msd.de

* Abkürzung für Low Density Lipoprotein Cholesterin;

1. R. Capece et al.: JACC, 2004, Volume 43 (5), Supplement A: 1084–1174

04-05-VYT-04-MSP-6268b-J-(D)

Herz

3/2004

Für die Hausarztpraxis

Regelmäßige Beilage der Notfall & Hausarztmedizin

Editorial

- 4 **Ich weiß, Sie können's auch schon nicht mehr hören ...**
Günther Buck

Schwerpunkt

- 5 **Besser ambulant? – Diagnostik und Therapie der Phlebothrombose**
Michael Emter


- 8 **Embolieprophylaxe – Aktuelles zur Antikoagulation bei Vorhofflimmern**
Christoph Stellbrink

- 11 **Blickpunkt**

- 15 **Impressum/Vorschau**

Blickpunkt

- 11 **Zeit zum Umdenken – Risikoorientierte Therapiestrategien in der Kardiologie**
12 **Nicht nur auf LDL fokussieren: HDL hoch – Risiko herunter**
13 **Neuer Kurs in der Lipidtherapie – Mit dualer Hemmung Zielwerte erreichen**



Titelbild: Werner Schulz

Regelmäßige Beilage der
Notfall & Hausarztmedizin
(E 2684 • ISSN 1612-
853/1612-859)

1. Jahrgang
Karl Demeter Verlag
im Georg Thieme Verlag
Rüdigerstraße 14
70469 Stuttgart



Verantwortliche Schriftleitung:
Prof. Dr. med. Hagen Sandholzer, Leipzig
Dr. med. Heribert Brück, Erkelenz
Bundesverband Niedergelassener Kardiologen e.V. (BNK)
Dr. med. Michael Emter, Hannover
Vertragsärztliche Arbeitsgemeinschaft
„Gefäßerkrankungen“ e.V. (VAG)

Bundesverband Niedergelassener
Kardiologen e.V. (BNK)
www.bnk.de



Redaktion:
Günther Buck

Vertragsärztliche Arbeitsgemeinschaft
„Gefäßerkrankungen“ e.V. (VAG)
www.v-a-g.de