


Mit Klebestreifen auf Wurmfang

Die Enterobiasis gehört weltweit zu den häufigsten Parasitosen des Menschen. Ursachen für die hohe Infektionsrate sind vor allem die schnelle Reifung der Eier und das Fehlen eines Zwischenwirts. Eine Infektion mit dem (Kinder-)Madenwurm *Enterobius vermicularis* tritt häufig bei Kindern, aber auch bei älteren Menschen in Gruppen und Heimen auf. Informieren Sie sich über Biologie und Morphologie, aber vor allem auch über Entnahme- und Untersuchungsmethoden bei Verdacht auf eine Infektion.

Seite 14



Nicht zu viel und nicht zu wenig

Thrombozytenaggregationshemmer dienen zur Prävention von ischämischen Gefäßerkrankungen wie Herzinfarkt oder Schlaganfall. Sie sollen eine Gerinnselbildung und vor allen Dingen nachfolgende Embolien verhindern.

Bei einem bestimmten Prozentsatz von Patienten stellt man jedoch mit verschiedenen Testmethoden fest, dass die erwartete Hemmung der Thrombozytenfunktion in vitro ausbleibt. Wie kann die Labordiagnostik helfen?

Seite 10

Aktuelles

Forschung	4
Gesundheitspolitik	6
Bücher	7
Aus der Industrie	8

Fachbeiträge

Hämostaseologie	
Thrombozytenaggregationshemmung (1)	10
Parasitologie	
Der (Kinder-)Madenwurm	14
Radiolog. Diagnostik	
Oberbauchorgane in CT und MRT (1.1)	18
Histologie	
Diagnostische Bedeutung der DNA-Zytometrie (3)	21
Englisch	
Reading English Papers (4): Peripheral Arterial Disease	24
Molekularbiologie	
Der genetische Fingerabdruck	26
Auf einen Blick	
Laborparameter: Lithium	29

dvta-Service

Aus dem Verband	
Spenden Kinderhospiz Sternenbrücke	30
Neujahrsgruß	30
Neues Eingruppierungsrecht im öffentlichen Dienst	31
Medizinische Fachberufe am Runden Tisch	31
Stipendien-Fonds für Weiterbildung	36