

IN|FO|NEUROLOGIE & PSYCHIATRIE

Interdisziplinäre Fortbildung in der Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie

EDITORIAL

1 AIP wurde abgeschafft

Was wird jetzt aus den lang laufenden klinischen Forschungsprojekten?

H.-C. Diener, Essen

JOURNAL SCREEN

6 Creutzfeldt-Jakob-Krankheit

Proteinnachweis bei sporadischer Creutzfeldt-Jakob-Krankheit. Nicht alle Patienten werden erkannt

I. Zerr, Göttingen

7 Diagnose der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit: Ist die Kernspintomographie das beste Instrument zur Früherkennung?

M. Forsting, Essen

10 Demenz

Erhöhte Homocysteinspiegel: Doch kein Risikofaktor für Alzheimer-Demenz?

M. Gerwig, Essen

12 Welche Demenzform liegt vor?

Dopamintransporter-PET gibt Aufschluss

J. Lewerenz, C. Weiller, Hamburg

16 Neuropsychiatrische Symptome bei Alzheimer-Demenz. Der Betreuungsstress lässt sich senken

C. W. Wallesch, Magdeburg

13 Depression

Therapie der wahnhaften Depression: Sind atypische Neuroleptika wirksam?

M. Bauer, Berlin

14 Diabetische Polyneuropathie

Schmerzlinderung bei diabetischer Polyneuropathie. Erste Daten sprechen für Venlafaxin

H.-C. Diener, Essen

18 Dopaminhypothese

Therapiestudie stützt die Dopaminhypothese der Depression. Dopaminagonist wirkt antidepressiv

D. Ebert, Freiburg i. Br.

20 Gliomatosis cerebri

Initiale Behandlung der Gliomatosis cerebri. Viele Patienten profitieren von der primären Chemotherapie

M. Weller, Tübingen

24 Imperative Stimmen

Kognitive Verhaltenstherapie: Jetzt auch ein Therapieansatz für imperative Stimmen?

R. Vauth, Basel

8 Info-Notiz

Schmerz und Placebo wirken in denselben Hirnregionen. Ist das Rätsel um die Placebowirkung wissenschaftlich gelöst?

H.-C. Diener, Essen

22 Buchbesprechung: Psychiatrische

Begutachtung. Ein praktisches Handbuch für Ärzte und Juristen

S.-U. Kutscher, Essen

26 Phasenprophylaxe

Rückfallprävention der bipolaren Störung. Adjuvante Gabe von Olanzapin vor allem für Frauen sinnvoll?

H. Jahn, Hamburg

30 Schlaganfall

Kardiovaskuläre Prävention bei Typ-2-Diabetes. Statin schützt vor dem ersten Schlaganfall

H.-C. Diener, Essen

32 Trauma

Repetitive transkranielle Magnetstimulation: Wirksam bei posttraumatischer Belastungsstörung?

F. Padberg, München

33 Zufallsstudie

Bei Depression auch das Noradrenalin-system beeinflussen. Dualer Ansatz ist viel versprechend

T. C. Baghai, München

Beihefter, Beilage

Kongressreport: Duloxetine – eine neue Option in der Depressionstherapie (S. 58)

Kongressreport: Langzeittherapie der Schizophrenie. 1-Jahres-SOHO-Daten zeigen Unterschiede innerhalb der Atypika (S. 68)

Medizin Forum: Gewichtszunahmerisiko minimieren, Diabetesrisiko eindämmen

Titelbild: Corbis