

Cochrane Library

- 160** J. McGrath, J.W.D. McDonald, J.K. MacDonald
Transdermales Nikotin zur Remissionsinduktion bei Colitis ulcerosa
- 162** G. Bjelakovic, D. Nikolova, R.G. Simonetti, C. Gluud
Antioxidative Nahrungsergänzungsmittel zur Prävention gastrointestinaler Karzinome

Der PRAXIS-Fall

- 163** R. Wyss Lustenberger
23-jährige Patientin mit chronischer Diarrhoe

PRAXIS-Journal Club


- 165** K. Eichler
Offene oder laparoskopisch assistierte Kolektomie bei Dickdarmkrebs?
- 167** M. Puhan
Eradikationstherapie einer Helicobacter pylori-Infektion in der Allgemeinbevölkerung ohne Einfluss auf Symptome

Rubriken

- 176** Impressum
- UG 3** Vorschau

Magazin

- 172** Eine literarische Sprechstunde



Andreafol®

schützt vor NRD

BAG und DACH empfehlen ...

allen Frauen, die schwanger werden möchten oder könnten

zusätzlich zu folsäurereicher Nahrung

die kontinuierliche Einnahme

von 0,4 mg Folsäure pro Tag in galenischer Form¹⁾

nichts mehr, nichts weniger und nichts anderes

¹⁾ Bulletin des Bundesamts für Gesundheitswesen 8/2001 und 6/2003; DACH Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr 2000
 Z: Folsäure 0.4 mg; I: Vorbeugung von Neuralrohrdefekten; D: 1 T tägl.; KI: Überempfindlichkeit gegen Inhaltsstoff; UAW: selten allergische Reaktionen oder leichte gastrointestinale Störungen; IA: v.a. Folsäureantagonisten, Antiepileptika; P: 30 und 90 T; Verkaufskategorie C. Andreafol AG, 4054 Basel. Mehr im Compendium