

DONNERSTAG 17. MÄRZ 2005



Nur wenige Frauen für Geburt per Sectio

Im Westen Deutschlands entbindet etwa jede vierte Frau per Kaiserschnitt – Tendenz steigend. Doch nur selten geschieht dies auf Wunsch der Frauen.

GESUNDHEITSPOLITIK 5



Hypertone Diabetiker sind stark gefährdet

Hypertone Diabetiker haben ein hohes Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall. Rat bekommen Betroffene bei der Diabetes-Aktion, die in Frankfurt/Main zu Gast ist.

MEDIZIN 11

EBMHOTLINE...EBMHOTLINE...

Die EBM-Fragen des Tages:

- Lassen sich Basiskomplex und Einzelleistungen nebeneinander abrechnen?
- Sind Samstag-Sprechstunden in meinem Regelleistungsvolumen enthalten?

EBMHOTLINE

- Hebt die Kopfpauschale die EBM-Wirkung nicht auf?
- Ist das EKG zusätzlich zum orthopädischen Hausarzt-

Praxisstudie macht klar: Therapie bei Struma muß viel besser sein

Daten von 20 000 Struma-Patienten aus Papillon 3/Spezialistin g

MÜNCHEN (gwa). Zwei von drei medikamentös behandelten Struma-Patienten haben keine TSH-Werte im Zielbereich (0,3 bis 1,2 mU/l). Nur knapp ein Drittel der Patienten erhalten die von Spezialisten favorisierte Kombination mit Jodid und L-Thyroxin. Das sind wichtige Ergebnisse von Papillon 3.

Papillon ist eine Schilddrüsen-Initiative, in der Daten zu Schilddrüsen-Erkrankungen in Deutschland erhoben werden. Gestern sind die Daten von Papillon 3 zum Stand der Struma-Therapie beim 1. Münchner Schilddrüsenseminar



reich zwischen wie etwa v...
sellschaft f...
fohlen. Jed...
gische TSH...
über 4,0 m...

Welche komplizier...
„Bei Strum...
bithérapie...
150 µg J...
75 µg. Zur...
alle drei M...
der Zielbe...
liere ich TS...
che einen...
fessor Petr...
ger vom K...
Bogenhe...