

- P 4.11 Supplementierung mit Mikronährstoffen in der Osteoporosebehandlung  
Schmidt S.; Wiesmoor
- P 4.12 Osteoanabole Therapie der manifesten Osteoporose beim jungen Patienten mit Teriparatid (Forsteo) – Ein-Jahres-Ergebnisse  
Niedhart C., Schippmann T., Niethard F. U.; Aachen
- P 4.13 Prävalenz und Verlauf Osteoporose-bedingter Skelettschmerzen nach Neueinstellung auf Raloxifen: Multizentrische, prospektive Beobachtung unter Praxisbedingungen über 6 Monate  
Scharla S., Oertel H., Helsberg K., Kessler F., Langer F.; Nickelsen T., Bad Homburg / Bad Reichenhall
- P 4.14 Monthly oral ibandronate is well tolerated in women with postmenopausal osteoporosis: 1-year results from MOBILE  
Felsenberg D., Bock O., Sedarati F., Mairon N., Bonvoisin B.; Berlin / Basel
- P 4.15 Schnelle Reduktion des Knochenabbaus unter Risedronat 35mg innerhalb von zwei  
Günther C., Kapner A., Schultis H.; Bad Füssing / Weiden
- P 4.16 Micronährstoffe als wichtige Supplementierung in der Osteoporosebehandlung  
Schmidt S.; Wiesmoor
- P 4.17 Gesundheitsökonomischer Vergleich von drei zur Behandlung der Osteoporose empfohlenen Arzneistoffen  
Brecht J.G., Kruse H.-P., Möhrke W., Lyssy A., Huppertz E.; Ingolstadt / Hamburg / Weiterstadt / Bad Soden am Taunus
- P 4.18 Monthly oral ibandronate is at least as effective as daily oral ibandronate in postmenopausal osteoporosis: 1-year results from MOBILE  
Felsenberg D., Bock O., Sedarati F., Mairon N., Bonvoisin B.; Berlin / Basel
- P 4.19 Behandlungsmöglichkeiten und Ergebnisse chirurgisch erstversorgter Frakturen des proximalen Humerus in einer osteologisch orientierten Rehabilitationseinrichtung  
Schmidt A.; Bad Liebenstein
- P 4.20 Vergleichende Studie über die tiefenwirksame, rhythmische Mikroextensionstechnik (Matrix-Rhythmus-Therapie) bei muskulo-skelettalen Beschwerden  
Jäger A., Dickreiter B., Randoll U.G.; Hannover / München
- P 4.21 Poor Adherence to Osteoporosis Therapy in Patients with acute Osteoporotic Fractures treated by Percutaneous Vertebroplasty  
Muschitz C., Patsch J., Krugluger J., Gründler J., Anderl W., Resch H.; Vienna
- P 4.22 Rehabilitation von Patienten mit sekundärer Osteoporose nach akuter Poliomyelitis  
Bocker B., Uhlemann C., Smolenski U.; Jena
- P 4.23 Tumor-induzierten Osteomalazie (TIO): Erfolge und Grenzen der Konservativen  
Brandenburg V.M., Westenfeld R., Riehl J.; Aachen
- P 4.24 Teriparatid - eine effektive osteoanabole Therapie bei progredienter glukokortikoidinduzierter Osteoporose mit multiplen Frakturen  
Lange U., Strube K., Teichmann J.; Bad Nauheim / Ludwigshafen
- P 4.25 Zoledronsäure erzielt bei M. Paget in kürzerer Zeit stärkere therapeutische Effekte als Risedronsäure  
Ringe J. D., Jakob F., Semler J., Kurth A.A., Stahl D., Saidi Y., Mesenbrink P., Kreiß A., Löffler H.W.; Nürnberg / Leverkusen / Würzburg / Berlin / Frankfurt / Leipzig / Basel / East Hanover
- P 4.26 Reduktion der Knochenresorptionsparameter bei hochfrequentiger Vibration mit tiefer Amplitude: eine Pilotstudie bei langjährig querschnittgelähmten Patienten  
Eser P., Zehnder Y., Kränzlin M., McLeod K.; Nottwil / Basel / New York
- P 4.27 Identification of Fast Bone Losers and Treatment with Alfacalcidol  
Dambacher M.A., Neff M., Abendroth K., Schacht E., Kissling R.; Zürich / Jena / Zürich
- P 4.28 Digitale Radiogrammetrie (DXR) und Dual-Energy-X-Ray-Absorptiometrie (DXA) bei Patienten mit Osteogenesis imperfecta unter Pamidronat-Therapie  
Mentzel H.-J., Land C., Böttcher J., Malich A., Rauch F., Kaiser W.A.; Jena / Montreal
- P 4.29 Does dosing regimen impact persistence with bisphosphonate therapy among postmenopausal osteoporotic women?  
Cramer J., Amonkar M., Hebborn A., Suppapanya N.; West Haven / Collegeville, PA / Basel
- P 4.30 Oral monthly ibandronate in postmenopausal bone loss: results from the Monthly Oral Pilot Study (MOPS)  
Wiese C., Barrett J., Worth E.; Basel