

- P 4.11 Supplementierung mit Mikronährstoffen in der Osteoporosebehandlung
Schmidt S.; Wiesmoor
- P 4.12 Osteoanabole Therapie der manifesten Osteoporose beim jungen Patienten mit Teriparatid (Forsteo) – Ein-Jahres-Ergebnisse
Niedhart C., Schippmann T., Niethard F. U.; Aachen
- P 4.13 Prävalenz und Verlauf Osteoporose-bedingter Skelettschmerzen nach Neueinstellung auf Raloxifen: Multizentrische, prospektive Beobachtung unter Praxisbedingungen über 6 Monate
Scharla S., Oertel H., Helsberg K., Kessler F., Langer F.; Nickelsen T., Bad Homburg / Bad Reichenhall
- P 4.14 Monthly oral ibandronate is well tolerated in women with postmenopausal osteoporosis: 1-year results from MOBILE
Felsenberg D., Bock O., Sedarati F., Mairon N., Bonvoisin B.; Berlin / Basel
- P 4.15 Schnelle Reduktion des Knochenabbaus unter Risedronat 35mg innerhalb von zwei
Günther C., Kapner A., Schultis H.; Bad Füssing / Weiden
- P 4.16 Micronährstoffe als wichtige Supplementierung in der Osteoporosebehandlung
Schmidt S.; Wiesmoor
- P 4.17 Gesundheitsökonomischer Vergleich von drei zur Behandlung der Osteoporose empfohlenen Arzneistoffen
Brecht J.G., Kruse H.-P., Möhrke W., Lyssy A., Huppertz E.; Ingolstadt / Hamburg / Weiterstadt / Bad Soden am Taunus
- P 4.18 Monthly oral ibandronate is at least as effective as daily oral ibandronate in postmenopausal osteoporosis: 1-year results from MOBILE
Felsenberg D., Bock O., Sedarati F., Mairon N., Bonvoisin B.; Berlin / Basel
- P 4.19 Behandlungsmöglichkeiten und Ergebnisse chirurgisch erstversorgter Frakturen des proximalen Humerus in einer osteologisch orientierten Rehabilitationseinrichtung
Schmidt A.; Bad Liebenstein
- P 4.20 Vergleichende Studie über die tiefenwirksame, rhythmische Mikroextensionstechnik (Matrix-Rhythmus-Therapie) bei muskulo-skelettalen Beschwerden
Jäger A., Dickreiter B., Randoll U.G.; Hannover /München
- P 4.21 Poor Adherence to Osteoporosis Therapy in Patients with acute Osteoporotic Fractures treated by Percutaneous Vertebroplasty
Muschitz C., Patsch J., Krugluger J., Gründer J., Anderl W., Resch H.; Vienna
- P 4.22 Rehabilitation von Patienten mit sekundärer Osteoporose nach akuter Poliomyelitis
Bocker B., Uhlemann C., Smolenski U.; Jena
- P 4.23 Tumor-induzierten Osteomalazie (TIO): Erfolge und Grenzen der Konservativen
Brandenburg V.M., Westenfeld R., Riehl J.; Aachen
- P 4.24 Teriparatid - eine effektive osteoanabole Therapie bei progredienter glukokortikoidinduzierter Osteoporose mit multiplen Frakturen
Lange U., Strube K., Teichmann J.; Bad Nauheim / Ludwigshafen
- P 4.25 Zoledronsäure erzielt bei M. Paget in kürzerer Zeit stärkere therapeutische Effekte als Risedronsäure
Ringe J. D., Jakob F., Semler J., Kurth A.A., Stahl D., Saidi Y., Mesenbrink P., Kreiß A., Löffler H.W.; Nürnberg / Leverkusen / Würzburg / Berlin / Frankfurt / Leipzig / Basel / East Hanover
- P 4.26 Reduktion der Knochenresorptionsparameter bei hochfrequentiger Vibration mit tiefer Amplitude: eine Pilotstudie bei langjährig querschnittgelähmten Patienten
Eser P., Zehnder Y., Kränzlin M., McLeod K.; Nottwil / Basel / New York
- P 4.27 Identification of Fast Bone Losers and Treatment with Alfacalcidol
Dambacher M.A., Neff M., Abendroth K., Schacht E., Kissling R.; Zürich / Jena / Zürich
- P 4.28 Digitale Radiogrammetrie (DXR) und Dual-Energy-X-Ray-Absorptiometrie (DXA) bei Patienten mit Osteogenesis imperfecta unter Pamidronat-Therapie
Mentzel H.-J., Land C., Böttcher J., Malich A., Rauch F., Kaiser W.A.; Jena / Montreal
- P 4.29 Does dosing regimen impact persistence with bisphosphonate therapy among postmenopausal osteoporotic women?
Cramer J., Amonkar M., Hebborn A., Suppapanya N.; West Haven / Collegeville, PA / Basel
- P 4.30 Oral monthly ibandronate in postmenopausal bone loss: results from the Monthly Oral Pilot Study (MOPS)
Wiese C., Barrett J., Worth E.; Basel